ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

10 Клінічна бактеріологія

Категорія: **Бактеріологія**

Кількість запитань: **29**

1. Який термін видачі заключної негативної відповіді при дослідженні крові на стерильність?

A) На 21-у добу

B) На 25-ту добу

*** C) На 11-ту добу**

2. Які з приведених ознак характерні для госпітальних штамів мікроорганізмів?

A) Кислотостійкість

B) Фагорезистентність

*** C) Полірезистентність до антибіотиків**

3. Який з перерахованих мікроорганізмів не входить до складу облігатної мікрофлори слизової оболонки носа?

A) Staphylococcus saprophyticus

B) Streptococcus viridans

*** C) Streptococcus pyogenes**

D) Непатогенні нейсерії

4. Який термін видачі заключної негативної відповіді при дослідженні крові на стерильність?

A) 0"На 25-ту добу

B) На 21-у добу

*** C) На 11 добу**

5. Вкажіть ознаки, притаманні госпітальним штамам мікроорганізмів:

A) Кислоторезистентність

B) Фагорезистентність

*** C) Полірезистентність до антибіотиків**

6. Вкажіть мікроорганізми, що не входять до облігатної резидентної мікрофлори слизової носа:

A) St. saprophyticus

B) Str. viridans

C) Непатогенні нейсерії

*** D) Str. Pyogenes**

7. Вкажіть співвідношення аеробної і анаеробної мікрофлори, характерне для нормобіоценозу кишечника людини:

A) 1:1

B) 10:1

*** C) 1:100**

8. Які з приведених анаеробних мікроорганізмів переважають в нормомікробіоценозі кишечника людини?

A) Фузобактерії

B) Клостридії

*** C) Біфідобактерії**

9. Які з приведених факультативно-анаеробних мікроорганізмів переважають в нормомікробіоценозі кишечника людини?

*** A) Escherichia**

B) Staphylococcus

C) Citrobacter

D) Candida

10. Яка з приведених концентрацій біфідобактерій (кількість мікробних клітин в 1 кубічному сантиметрі) розцінюється як нижня межа норми їх вмісту у фекаліях?

A) 10 в ступені 4

B) 10 в ступені 5

*** C) 10 в ступені 7**

D) 10 в ступені 10

11. Який рівень Н-антитіл є діагностичним при підозрі на інфікування нирок протеями?

A) 1:40

B) 1:80

*** C) 1:200**

12. Який з наведених клінічних матеріалів підлягає бактеріологічному дослідженню на мікоплазми?

A) Виділення з рани

B) Кров

*** C) Мокротиння**

13. З яким видом протеїв найчастіше пов`язані урологічні інфекції?

A) P.vulgaris

B) P.mixofaciens

*** C) P.mirabilis**

14. Яке середовище використовують для виділення протеїв з клінічного матеріалу?

A) Ендо

B) 5 % кров`яний агар

*** C) Плоскирєва**

15. Вкажіть, яка мінімальна кількість мікробних клітин Str.pneumoniae та H.influenzae в 1 мл відділяємого верхніх дихальних шляхів має діагностичне значення при бактеріологічному дослідженні:

A) 10 в ступені 8

B) 10 в ступені 10

*** C) 10 в ступені 6**

16. Вкажіть поживні середовища, на які роблять засів донорської крові при контролі на стерильність:

A) Цукровий бульйон

*** B) Тіогліколеве середовище**

C) Середовище Сабуро

D) Бульйон Хоттінгера

17. Вкажіть родину, до якої належать гриби роду Candida:

A) Родини не визначено

B) Brucellaceae

*** C) Cryptococcaceae**

18. Які властивості використовують з метою диференціювання грибів роду Candida від інших грибів?

A) Біохімічні

B) Серологічні

*** C) Морфологічні**

D) Культуральні

19. За якими ознаками диференціюють гриби роду Candida на види?

A) Серологічними

*** B) Біохімічними**

C) Культуральними

20. Яке з наведених середовищ використовують для виділення грибів роду Candida?

A) Ендо

B) Плоскирєва

* **C) Сабуро**

D) Жовточно-сольовий агар

21. Як ви вважаєте, чи досить факту виявлення грибів Candida albicans для встановлення діагнозу "кандидоз"?

A) Так

* **B) Ні**

22. Який з наведених вуглеводів входить до складу середовища Сабуро?

A) Лактоза

B) Маніт

* **C) Глюкоза**

23. Який індикатор входить до складу середовища Сабуро?

A) Основний фуксин

B) Нейтральний фуксин

* **C) Середовище без індикатора**

24. Які з наведених властивостей притаманні мікроорганізмам роду Campylobacter?

A) Утворення індолу

B) Продукція гемолізинів

* **C) Розщеплення сечовини**

25. Яка з наведених клостридій є збудником газової гангрени?

*** A) Cl.perfringens**

B) Cl.botulinum

C) Cl.tetani

D) Cl.difficile

26. До якої з перерахованих груп відносяться збудники ГКЗ (гострі кишкові захворювання) з роду Campylobacter?

A) Психрофіли

B) Мезофіли

*** C) Термофіли**

27. Який метод діагностики кампілобактеріоза є більш достовірним?

A) Серологічний

*** B) Бактеріологічний**

C) Бактеріоскопічний

28. Які з наведених ознак непритаманні мікроорганізмам роду Campylobacter?

*** A) Наявність двополярних джгутиків**

B) Гвинтоподібний рух

C) Швидка деградація культури на штучних поживних середовищах

29. Який з перерахованих патологічних матерілів не підлягає бактеріологічному дослідженню на мікроорганізми роду Campylobacter?

A) Нативні випорожнення

B) Вміст прямої кишки

*** C) Жовч**