

ЗАВАНТАЖЕНО З САЙТУ ТЕСТУВАННЯ.УКР

Нормальна анатомія - база тестів 2001 року

Категорія: **Бази тестів українською мовою 2001 року**

Кількість запитань: **295**

1. До клініки потрапив хворий з пораненням м'яких тканин шиї та пошкодженням шийного вітрила "Ріше". Яка з фасцій шиї його утворює?

*** А) lamina profunda fasciae colli propriae**

В) lamina superficialis fasciae colli propriae

С) fascia colli superficialis

Д) fascia endocervicalis

Е) fascia prevertebralis

2. У хворого після перелому верхньої третини плечової кістки розвинувся параліч задньої групи м'язів плеча і передпліччя. Який нерв пошкоджено?

*** А) Променевий**

В) Ліктьовий

С) Серединний

Д) М'язово-шкірний

Е) Пахвовий

3. Хворий не може розігнути гомілку, у нього відсутня шкірна чутливість на передній поверхні стегна. Неврологічне обстеження виявило ураження нерва. Якого?

*** А) Стегнового**

В) Затуленого

С) Сідничного

Д) Верхнього сідничного

Е) Статено-стегновий

4. У хворого запалення середнього вуха ускладнилось мастоїдітом. Надалі виникла загроза гнійного тромбозу найближчої венозної пазухи. Якої?

*** А) Сигмоподібної**

- В) Поперечної
- С) Верхньої сагітальної
- Д) Прямої
- Е) Нижньої кам'янистої

5. Хворому проводиться операція з приводу тромбонижньої брижової артерії. Які відділи шлунково-кишкового тракту слід обстежити під час операції, щоб виявити можливий некроз?

*** А) Низхідну ободову, сигмоподібну, пряму кишку**

- В) Шлунок
- С) Дванадцятипалу кишку
- Д) Порожню та клубову кишку
- Е) Сліпу та висхідну ободову кишку.

6. В хірургічне відділення доставлено чоловіка 35 років з гнійною раною на шиї попереду трахеї (в ділянці передвісцерального простору). Куди може розповсюджуватись інфекція, якщо хворому терміново не зроблять операцію?

*** А) В грудну порожнину - переднє середостіння**

- В) В грудну порожнину – в середнє середостіння
- С) В грудну порожнину – в заднє середостіння
- Д) В ретровісцеральний простір
- Е) В надгрудинний міжапоневротичний простір

7. Чоловіка 45 років доставлено в хірургічне відділення з різаною раною у медіальному краї передпліччя. Обстеження показало, що у хворого перерізано два м'язи передпліччя - ліктьовий згинач зап'ястка і ліктьовий розгинач зап'ястка. Які рухи не може виконувати хворий?

*** А) Приведення кисті**

В) Згинання кисті

С) Розгинання кисті

Д) Відведення кисті

Е) Розгинання і відведення кисті

8. У деяких народів Африки у дітей не буває дисплазії кульшового суглобу. До цього призводить:

*** А) Положення дитини на стегні матері з розведеними ніжками.**

В) Положення дитини зі зведеними ніжками.

С) Туге пелювання немовляти.

Д) Генетичні фактори.

Е) Особлива форма колиски.

9. При травмі в області тазу у хворого на рентгенологічному знімку виявлено некроз головки стегнової кістки. Яка з перелікованих зв'язок культового суглобу містить артерію, кровопостачаючу головку стегнової кістки, була пошкоджена під час травми.

*** А) Зв'язка головки стегнової кістки.**

В) Клубово-стегнова зв'язка

С) Лобкова-стегнова зв'язка.

Д) Сіднично-стегнова зв'язка.

Е) Коловий пояс.

10. Лижник, спускаючись з крутого схилу гори, не зміг вчасно загальмувати і впав на правий зігнутий колінний суглоб з пронацією гомілки. З гострою білью він був госпіталізований у травматологічне відділення. Механізм цієї травми характерен при поразці:

*** А) Медіальний меніск.**

В) Латеральний меніск.

С) Поперечна зв'язка коліна

Д) Передня схрещена зв'язка.

Е) Задня схрещена зв'язка.

11. Поклавши хворого на спину та зігнувши його травмовану ногу на 90° , лікар, після повного розслаблення м'язів нижньої кінцівки перевірів симптом "висувного ящика". Він захопив гомілку травмованої ноги в верхній третині та рухав її вперед та назад по відношенню до стегна, зафіксувавши при цьому стопу. Лікар знайшов патологічне зміщення гомілки вперед по відношенню до стегна. Це свідчить про повний розрив зв'язки колінного суглобу:

*** А) Передня схрещена зв'язка.**

В) Задня схрещена зв'язка.

С) Великогомілкова колатеральна зв'язка.

Д) Малогомілкова колатеральна зв'язка.

Е) Поперечна зв'язка коліна.

12. Травматолог кладе свої великі пальці обернуті марлюю на жувальні поверхні нижніх молярів хворого, другими пальцями захвачує нижній край нижньої щелепи та сильно тягне її до низу, а підборіддя у цей час повертає ввверх. Далі щелепа відводиться назад. Що лікує травматолог?

*** А) Вивих нижньої щелепи.**

- В) Перелом основи нижньої щелепи.
- С) Перелом тіла нижньої щелепи.
- Д) Артроз висково-нижньощелепного суглоба.
- Е) Запалення ясен.

13. Педіатр оглянув дитину 11,5 місяців. Скарг немає. Дитина активна, тримає голову, сидить, стоїть в манежі. Які вигини хребтового стовпа у нього сформувалися?

*** А) Шийний лордоз, грудний кіфоз, поперековий лордоз, крижовий кіфоз.**

- В) Шийний лордоз, грудний кіфоз, поперековий лордоз.
- С) Грудний лордоз, поперековий лордоз, крижовий кіфоз.
- Д) Шийний лордоз, крижовий кіфоз.
- Е) Шийний лордоз, грудний кіфоз, крижовий кіфоз.

14. У юнака 16 років під час автомобільної катастрофи був пошкоджений хребет. Огляд невропатолога показав, що у нього відсутня тактильна чутливість лівої половини тулуба, хоча хребет пошкоджено справа. Пошкодження якого провідного шляху могло бути причиною цього?

*** А) Tr. spino-thalamicus anterior справа**

- В) Tr. spino-thalamicus anterior зліво
- С) Tr. spino-thalamicus anterior справа
- Д) Tr. spino-thalamicus anterior зліва
- Е) Пучки Голля і Бурдаха справа

15. У чоловіка 40 років після черепно-мозкової травми спостерігається випадіння зору правих половин сітківки обох сторін. Очі без патології. Де наймовірніше всього може бути локалізоване пошкодження?

*** А) В корковому кінці зорового аналізатора справа**

- В) В корковому кінці зорового аналізатора зліва
- С) В ділянці зорового перехрестя
- Д) В зоровому нерві
- Е) В латеральному ядрі таламуса

16. У хворого 68 років після інсульту (кровоизлиття в головний мозок) спостерігається відсутність вольових рухів м'язів тулуба справа. Додаткове обстеження за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться зліва в задній ніжці внутрішньої капсули поруч з коліном. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?

*** А) Tr. cortico-spinalis**

- В) Tr. cortico-nuclearis corticalis thalamicus
- С) Tr. thalamo-corticalis
- Д) Tr. cortico-thalamicus
- Е) Tr. cortico-fronto-pontinus

17. У хворого після перенесеного менінго-енцефаліту з'явилися ознаки водянки головного мозку (накопичення спинномозкової рідини в шлуночках головного мозку). Що могло бути причиною цього явища?

*** А) Зарощення апертур Маженді і Люшка IV шлуночка**

- В) Зарощення міжшлуночкового отвору зліва
- С) Зарощення міжшлуночкового отвору справа
- Д) Зарощення водопроводу головного мозку
- Е) Зарощення центрального каналу спинного мозку

18. У чоловіка 35 років внаслідок травми пошкоджено шостий шийний хребець. Який сегмент спинного мозку може бути пошкодженим у нього?

*** А) 5-й шийний.**

В) 3-й шийний

С) 4-й шийний.

Д) 6-й шийний

Е) 7-й шийний.

19. Внаслідок перенесеної травми хребта у хворого відсутня больова і температурна чутливість лівої половини і тулуба. Пошкодження якого провідного шляху може бути причиною цього явища?

*** А) Tr.spino-thalamicus lateralis справа.**

В) Tr.spino-thalamicus lateralis зліва.

С) Tr.spino-thalamicus anterior справа.

Д) Tr.spino-thalamicus anterior зліва.

Е) Пучки Голля і Бурдаха зліва.

20. Внаслідок травми черепа стався перелом клиновидної кістки в ділянці основи крилоподібного відростка. Вміст якого з названих каналів може бути пошкоджено?

*** А) Крилоподібний.**

В) М'язовотрубний.

С) Барабанний.

Д) Сонний.

Е) Лицевий.

21. Внаслідок інсульту (кровозлиття в головний мозок) у хворого відсутні вольові рухи м'язів голови і шиї. Обстеження головного мозку за допомогою ЯМР показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?

*** A) Tr.cortico-nuclearis.**

B) Tr.cortico-spinalis.

C) Tr.cortico-thalamicus.

D) Tr.cortico-fronto-pontinus.

E) Tr.thalamo-corticalis.

22. У чоловіка 60 років при профілактичному обстеженні виявлено зниження всіх видів чутливості на правій половині тулуба.Додаткове обстеження за допомогою ЯМР виявило у хворого невелику пухлину головного мозку, що локалізована в задній ніжці внутрішньої капсули зліва.Пошкодження якого провідного шляху було причиною зазначеної симптоматики?

*** A) Tr.spino-thalamicus.**

B) Tr.cortico-spinalis.

C) Tr. cortico-nuclearis.

D) Центральний слуховий шлях.

E) Центральний зоровий шлях.

23. Після невдалого стрибка з висоти спортсмен був доставлений до травмпункту зі скаргами на різкий біл та набряк в області правої стопи. При обстеженні права стопа у задній її третині різко болюча при пальпації, наявний кроподтік на подошві, рухи у надп'яtkово-гомiлковому суглобі можливі у повному обсязі. Які кістки можуть бути пошкоджені?

*** A) П'яткова кістка**

B) Великогомiлкова кістка

C) Променева кістка

D) Фаланги пальців стопи

E) Малогомiлкова кістка

24. При переході вулиці у невстановленому місці дитина була вдарена бампером автомобіля у лівий бік. Доставлена до лікарні, де при огляді виявлений кровоподтік на лівій половині грудної клітини, різка болючість при пальпації, при спробі здавити грудну клітину відчувається хруст. Які кістки можуть бути пошкоджені?

*** А) Ребра**

- В) Грудні хребці
- С) Ключиця
- Д) Лопатка
- Е) Тазова кістка

25. Під час підняття хлопець вдарився головою о дно озера. При огляді виявляється різка болючість шиї, слабкість у верхніх кінцівках, повертання голови здійснити не може. Які кістки можуть бути пошкоджені?

*** А) Шийні хребці**

- В) Лобна кістка
- С) Під'язикова кістка
- Д) Лопатка
- Е) Ключиця

26. При падінні на приведену до тулуба праву руку постраждалий відчув хруст та різкий біль у верхній третині правого плеча. Рухи у плечі неможливі, є деформація у верхній його третині. Які кістки можуть бути пошкоджені?

*** А) Плечова кістка**

- В) Лопатка
- С) Ключиця
- Д) Грудина
- Е) Ребра

27. Хокеїст при падінні на коліна відчув різкий біль та хруст в області лівого колінного суглоба. При огляді виявлений сильний набряк в області лівого колінного суглоба та верхньої третини лівої гомілки, кровопідтік і біль передньої поверхні лівого колінного суглоба. Рухи у суглобі у повному об'ємі. Які кістки можуть бути пошкоджені?

*** А) Наколінок**

- В) Малогомілкова кістка
- С) Сіднична кістка
- Д) Стегнова кістка
- Е) Великогомілкова кістка

28. Під час ожеледиці жінка впала на витягнену руку і відчула різкий біль. З'явилась деформація у нижній третині правого передпліччя, набряк і неможливість рухів у правій кисті. Які кістки можуть бути пошкоджені?

*** А) Променева та ліктьова кістки**

- В) Півмісяцева кістка та перша п'яткова кістка
- С) Плечова кістка та лопатка
- Д) Кістки п'ястка та фаланг пальців руки
- Е) Тазова кістка

29. Після зіштовхнення двох автомобілів у одного з водіїв відзначається деформація у середній третині лівої гомілки, сильний біль, особливо при спробі рухати лівою гомілкою. З рани виступають кінці кістки тригранного січення, посилюється крововтрата. Які кістки можуть бути пошкоджені?

*** А) Великогомілкова кістка**

- В) Малогомілкова кістка
- С) Стегнова кістка
- Д) Наколінок
- Е) Надп'яткова кістка

30. Будівник впав з висоти та вдарився лівою половиною тіла, після чого відчув сильний біль у верхній третині лівого стегна. Стати на ліву ногу не може, рухи у лівій нижній кінцівці виконати не вдається. Посилюється набряк в області лівого кульшового суглоба та ознаки крововтрати. Які кістки можуть бути пошкоджені?

*** А) Шийка стегнової кістки**

В) Поперекові хребці

С) Крижова кістка

Д) Ребра

Е) Лобкова кістка

31. Дівчина під час виконання гімнастичних вправ, глибоко присівши, вдарилася об тверду поверхню областю крижі. Наступного дня вона стала відчувати різкий біль у місті удару, особливо при спробі сісти та ходінні. При огляді крижової області під шкірою у її нижній третині лікарем виявлений кровопідтік. Які кістки можуть бути пошкоджені?

*** А) Куприкова кістка**

В) Стегнова кістка

С) Лобкова кістка

Д) Сіднична кістка

Е) Грудина

32. Після звільнення з під завалу у постраждалого відзначається затемнення свідомості, багато підшкірних крововпливів на голові та шиї, дрібні рани на обличчі. У задньо-верхніх відділах голови скальпована рана та різка деформація контурів голови. Які кістки можуть бути пошкоджені?

*** А) Тім'яна та потилична кістка**

В) Клиновидна кістка та нижня щелепа

С) Лобна та носові кістки

Д) Сконева кістка та верхня щелепа

Е) Вилична кістка та слізна кістка

33. До стоматолога звернувся хворий с запаленням альвіоли другого верхнього кутнього зубу. Яка частина зубу буде уражена у першу чергу?

*** А) Корінь зубу**

В) Коронка зубу

С) Шийка зубу

Д) Порожнина коронки зубу

Е) Канал коріння зубу.

34. У стоматологічну поліклініку звернувся хворий із запаленням альвіолярного відростка верхньої щелепи (остеомиєліт). Яка тканина зуба може постраждати при цьому захворюванні у першу чергу?

*** А) Цемент**

В) Емаль

С) Дентин

Д) Пульпа

Е) --

35. Гостре респіраторне захворювання нерідко ускладнюється запаленням середнього вуха. Яка ділянка є місцем безпосереднього проникнення мікрофлори у середнє вуха?

*** А) Носоглотка**

В) Гортаноглотка

С) Гайморова пазуха

Д) Ротоглотка

Е) Лобна пазуха

36. У поліклініку звернувся хворий зі скаргами на затруднення при проходженні страви по стравохіду. При рентгенологічному обстеженні встановлено, що затримка має місце на рівні 5 грудного хребця. Пухлина якого органу може стримувати проходження страви у цьому відділі стравохіду?

*** А) Лівого головного бронху**

- В) Дуги аорти
- С) Правого головного бронху
- Д) Щітоподібної залози
- Е) Правої легені

37. У хірургічне відділення звернувся хворий з пухлиною в нижній частині стравохіду. Яка серозна оболонка грудної порожнини може бути пошкоджена при проведенні операції у цій області?

*** А) Права медіастинальна плевра**

- В) Ліва медіастинальна плевра
- С) Права реберна плевра
- Д) Діафрагмальна плевра
- Е) Ліва реберна плевра

38. У прийомне відділення лікарні доставили дитину зі скаргами на біль за грудиною, яка з'являється після ковтання та супроводжується кашлем. При рентгенологічному дослідженні виявлено інохідне тіло у товщі стінки стравохіду на рівні 5 грудного хребця. В області якого звуження стравохіду сталося пошкодження його стінки?

*** А) У місці перекрещення з лівим головним бронхом**

- В) У місці прилегання дуги аорти
- С) У місці проходження крізь діафрагму
- Д) У місці переходу в шлунок
- Е) У місці переходу глотки у стравохід

39. У клініку доставлений хворий 65 років зі скаргами на диспепсію та болі у епігастральній області. При ультразвуковому обстеженні виявлено пухлину ободової кишки. Була проведена операція резекції частки ободової кишки та лімфатичних узлів брижжи. Наявність якого артеріального анастомозу дозволить встановити кровообіг, якщо у ході операції довелося перев'язати стовбур верхньої брижжеїчної артерії.

*** А) Ріаланова дуга.**

В) Вілізіїв круг.

С) Порто-каваковальний анастомоз на передній стінці живота.

Д) Черевний стовбур.

Е) Кардіальний порто-кавальний анастомоз.

40. У новородженної дитини у течії перших суток педіатр помітив відсутність акту дефікації. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт.

*** А) Атрезія заднього проходу.**

В) Атрезія стравохіду.

С) Заяча губа.

Д) Дівертікул стравохіду.

Е) Паропронтит.

41. У клініку поступила дитина 9 місяців, в якої ще не прорізався жоден зуб. В які строки повинні прорізуватися перші зуби в нормі.

*** А) 6-7 міс.**

В) 5-6 міс.

С) 7-8 міс.

Д) 9-10 міс.

Е) 3-4 міс.

42. У новородженої дитини у течії першої доби педіатр помітив, що при смоктанні молока воно потрапляє у носову порожнину. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт.

*** А) Незарощення твердого склепіння.**

В) Атрезія заднього проходу.

С) Атрезія стравохіду.

Д) Заяча губа.

Е) Звуження стравохіду.

43. У новородженної дитини у течії першої доби педіатр помітив, що молоко матері повністю відригується дитиною. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

*** А) Атрезія стравохіду.**

В) Атрезія заднього проходу,

С) Заяча губа.

Д) Дівертікул стравохіду.

Е) Паропронтит.

44. Під час ультразвукового обстеження серця лікар спостерігає за стулками мітрального клапана. Що відбувається з ними при систолі передсердь?

*** А) Вивертаються в порожнину шлуночка**

В) Притискаються до стінок передсердя

С) Вивертаються в порожнину передсердя

Д) Стуляються, закриваючи просвіт отвору

Е) Притискаються до стінки судин

45. В хірургічне відділення поступив хворий у тяжкому стані з колотою раною в ділянці правого підребер'я і ознаками внутрішньої кровотечі. Після лапаротомії хірург виявив пошкодження паренхіми печінки і кров у черевній порожнині. З метою тимчасової зупинки кровотечі лікар наклав м'який затискач на печінково-дванадцятипалу зв'язку. Які судини перетиснено у товщі цієї зв'язки?

*** А) Власну печінкову артерію і ворітну вену**

- В) Печінкові вени і артерії
- С) Праву і ліву печінкові артерії
- Д) Черевний стовбур і брижову артерію
- Е) Загальну печінкову артерію і ворітну вену

46. У хворого на тимому (пухлину вилочкової залози) спостерігається ціаноз, розширення підшкірної венозної сітки і набряк м(яких тканин обличчя, шиї, верхньої половини тулуба і верхніх кінцівок. Який венозний стовбур перетиснено пухлиною?

*** А) Верхню порожнисту вену**

- В) Зовнішню яремну вену
- С) Підключичну вену
- Д) Внутрішню яремну вену
- Е) Нижню порожнисту вену

47. Під час розтину порожнин серця на внутрішній стінці були виявлені гребінцеві м'язи. Які відділи порожнин серця розкриті ?

*** А) Праве і ліве вушко**

- В) Правий і лівий шлуночок
- С) Ліве вушко і лівий шлуночок
- Д) Ліве передсердя і лівий шлуночок
- Е) Праве передсердя і правий шлуночок

48. Звуження крупної судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка. Яка судина зазнала патологічних змін?

*** А) Аорта**

- В) Легеневий стовбур
- С) Легенева вена
- Д) Верхня порожниста вена
- Е) Нижня порожниста вена

49. Підвищення кров'яного тиску в аорті, спричинило навантаження на серцевий м'яз. М(язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?

*** А) Лівий шлуночок**

- В) Ліве передсердя
- С) Правий шлуночок
- Д) Праве передсердя
- Е) Венозний синус

50. Під час операції на перетинчастій частині чоловічого сечівника виникла кровотеча. Які артерії потрібно перев'язати для її припинення?

*** А) Нижню прямокишкову та промежину**

- В) Нижню міхурову та верхню прямокишкову
- С) Середню прямокишкову та нижню міхурову
- Д) Глибоку артерію статевого члена та нижню міхурову
- Е) Верхню прямокишкову та промежину

51. Звуження крупної судини спричинило погіршення відтоку крові з лівого шлуночка. Яка судина зазнала патологічних змін?

*** А) Аорта**

- В) Легеневий стовбур
- С) Легенева вена
- Д) Верхня порожниста вена
- Е) Нижня порожниста вена

52. Підвищення кров'яного тиску в крупній судині, що несе кров до легень, спричинило навантаження на серцевий м'яз. М'язова стінка якої ділянки серця реагує на подразнення?

*** А) Правого шлуночка**

- В) Лівого шлуночка
- С) Правого передсердя
- Д) Лівого передсердя
- Е) Венозного синуса

53. При аускультатії (прослуховуванні) клапанів серця лікар виявив акцент другого тону в другому міжребер'ї зліва від груднини. Функція якого клапана визначається?

*** А) Клапан легеневого стовбура**

- В) Клапан аорти
- С) Лівого передсердно-шлуночкового
- Д) Правого передсердно-шлуночкового
- Е) Мітрального

54. У хворого із гнійним середнім отитом інфекція з барабанної порожнини поширилась на цибулину яремної вени з розвитком септичного стану. Анатомічною передумовою цього ускладнення є витончення або дигіценції однієї із стінок барабанної порожнини. Аномалія якої стінки має місце?

*** А) Нижньої**

- В) Верхньої
- С) Медіальної
- Д) Латеральній
- Е) Передньої

55. Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у середню черепну ямку?

*** А) Через верхню очноямкову щілину**

- В) Через передній решітчастий отвір
- С) Через задній решітчастий отвір
- Д) Через нижню очноямкову щілину
- Е) Через вилично-очноямковий отвір

56. Хворий з ускладненим диханням займає вимушену позу: сидячи край кроваті з опорою на руки. Який з названих м'язів не виконує ролі допоміжного дихального?

*** А) m. rhomboideus major**

- В) m. latissimus dorsi
- С) m. serratus anterior
- Д) mm. scaleni
- Е) mm. serrati posteriores

57. Рентгенологічно у пацієнта діагностований перелом плечової кістки в ділянці міжгорбкової борозни. Сухожилок якого м'яза може бути травмований уламками кістки в першу чергу?

*** А) Двоголового м'яза плеча**

- В) Дельтовидного м'яза
- С) Великого круглого м'яза
- Д) Найширшого м'яза спини
- Е) Великого грудного м'яза

58. У пацієнта після операції в ділянці переднього відділу шиї змінився голос внаслідок травмування нерва, що інервує м'яз - напружувач голосової зв'язки. Функція якого м'яза порушена?

*** А) Перснещитоподібного**

- В) Прямого черпакуватого
- С) Черпакувато-надгортанного
- Д) Переднього перснечерпакуватого
- Е) Заднього перснечерпакуватого

59. Операція на стегновій грижі ускладнилася внутрішньочеревною кровотечею. Який анастомоз був ушкоджений?

*** А) Лобкова гілка затульної артерії від внутрішньої клубової артерії і затульна гілка нижньої надчеревної артерії від зовнішньої клубової артерії**

- В) Верхня сіднича артерія від внутрішньої клубової артерії і медіальна артерія, що огинає стегнову кістку від глибокої артерії стегна
- С) Вертлюжна гілка затульної артерії від внутрішньої клубової артерії і медіальна артерія, що огинає стегнову кістку від глибокої артерії стегна
- Д) Нижня сіднича артерія від внутрішньої клубової артерії і медіальна артерія, що огинає стегнову кістку від глибокої артерії стегна
- Е) Поверхнева надчеревна артерія від стегнової артерії і верхня надчеревна артерія від внутрішньої грудної артерії

60. Під час патологоанатомічного розтину у померлого виявлено гній у задньому середостінні. Через який простір поширився запальний процес, що був локалізований у передньому відділі шиї?

*** А) Позадувісцеральний**

- В) Передвісцеральний
- С) Надгрудинний міжапоневротичний
- Д) Міждрабинчастий
- Е) Переддрабинчастий

61. Під час операції на тазовій частині сечоводу хірургу довелось перев'язати судини, які кровопостачають цю ділянку. Які артерії були перев'язані?

*** А) Середню прямокишкову та верхню міхурову**

- В) Верхню прямокишкову та нижню міхурову
- С) Середню прямокишкову та нижню міхурову
- Д) Нижню прямокишкову та нижню міхурову
- Е) Ниркову та промежину

62. При обстеженні пацієнта з ножовими ранами правої руки встановлена втрата чутливості шкіри бічної половини спинки кисті та проксимальних фаланг 1-го, 2-го і частково 3-го пальців. Який нерв пошкоджено?

*** А) поверхнева гілка променевого нерва**

- В) серединний
- С) ліктьовий
- Д) м'язово-шкірний
- Е) бічний шкірний передпліччя

63. У постраждалого виявлена рана верхньої частини передньої ділянки плеча. При обстеженні встановлена втрата активного згинання в ліктьовому суглобі і чутливості шкіри передньо-бічної поверхні передпліччя. Порушення якого нерва має місце?

*** А) м'язово-шкірного**

В) Променового

С) Серединного

Д) Ліктьового

Е) Пахвового

64. У постраждалого з глибокою травмою м'язих структур присередньої поверхні дистальної половини плеча при обстеженні виявлена втрата чутливості 5-го і 4-го пальців. Який нерв пошкоджено?

*** А) ліктьовий**

В) променевий

С) серединний

Д) присередній шкірний передпліччя

Е) м'язово-шкірний

65. Хворий після поранення лівої гомілки втратив здатність утримувати стопу в пронованому положенні. Який нерв пошкоджено?

*** А) поверхневий малогомілковий**

В) глибокий малогомілковий

С) Великогомілковий

Д) Сідничний

Е) загальний малогомілковий

66. Який нерв можна пошкодити при проведенні оперативного втручання з приводу варикозного розширення великої підшкірної вени?

*** А) підшкірний**

- В) Поверхневий малогомілковий
- С) Присередній шкірний нерв литки
- Д) бічний шкірний нерв литки
- Е) Великогомілковий

67. У новонародженого під час годування було помічено витікання молока з носа. Про яку ваду розвитку може свідчити цей симптом?

*** А) "Вовча паща"**

- В) атрезія стравоходу
- С) трахео-стравохідна нориця
- Д) мікростома
- Е) заяча губа

68. У дитини 3-х років у передній ділянці волосяної частини голови виявлено прогинання кісток черепа. Назвіть структуру, яка обумовлює це явище?

*** А) fonticulus anterior**

- В) fonticulus posterior
- С) fonticulus sphenoidalis
- Д) fonticulus mastoideus
- Е) fonticulus occipitalis

69. До лікаря звернулась мати одномісячної дитини з скаргами на те, що у дитини з'явився нахил голови в бік, а підборіддя повернуте в протилежну сторону. Назвіть м'яз, який обумовлює це явище?

*** A) m. sternocleidomastoideus**

B) m. scalenus anterior

C) m. splenius cervicis

D) m. longus colli

E) platysma

70. У дитини, яка народилась в строк, з нормальною масою, після кожного кормління з'являється блювання. Чим обумовлене це явище?

*** A) пілоростеноз**

B) атрезія стравоходу

C) трахео-стравохідна нориця

D) ахалазія стравоходу

E) мегадуоденум

71. При обстеженні одnorічної дитини чоловічої статі виявлена правостороння пахвинна кила. Яка структура може сприяти цьому захворюванню?

*** A) processus vaginalis peritonei**

B) fascia transversalis

C) tunica vaginalis tensus

D) musculus cremaster

E) tunica dartos

72. У гематологічне відділення поступила жінка 23 років. В неї були виявлені зміни у периферичній крові. Який орган треба обстежити для уточнення діагнозу?

*** А) червоний кістковий мозок**

- В) печінку
- С) червону пульпу селезінки
- Д) лімфатичний вузол
- Е) білу пульпу селезінки

73. Чоловіку 33 років, який приймав участь у ліквідації аварії на ЧАЕС, потрібна трансплантація червоного кісткового мозку. Який відділ довгих трубчастих кісток вірогідніше буде оперований?

*** А) methaphysis**

- В) diaphysis
- С) epiphysis
- Д) anophysis
- Е) canalis

74. Дитині 2-х років, хворій на запалення легень була зроблена рентгенографія грудної клітки на якій виявлена тінь загрудинної залози (thymus). До якого віку таке явище вважається нормою?

*** А) до 3-х років**

- В) до 5-и років
- С) до 7-ми років
- Д) до 10-и років
- Е) до 17-и років

75. Людина звернулася із скаргою на опік тильної сторони кисті гарячою рідиною. При огляді визначена наявність пухиря. Які структури шкіри пошкоджені?

*** А) епідерміс**

- В) роговий шар епідермісу
- С) роговий та блискучий шар епідермісу
- Д) епідерміс та дерма
- Е) епідерміс, дерма та підшкірна клітковина

76. У хворого в ділянці шиї виявлене поодиноке гнійне утворення - фурункул. В яких структурах шкіри міститься цей процес?

*** А) волосяний фолікул та сальна залоза**

- В) сальна залоза
- С) потова залоза
- Д) епідерміс
- Е) власне шкіра

77. До травматолога звернувся пацієнт 60 років з скаргами на загальну слабкість, болі у кістках. Лікар встановив ослаблення трофічної функції нервової системи. Яке явище у кістковій тканині може мати місце при цьому?

*** А) остеопороз**

- В) остехондроз
- С) остеосклероз
- Д) остефіт
- Е) остеомієліт

78. Хвора К., 30 років, скаржиться на сильну спрагу, сухість в роті, які з'явилися після сильного нервового потрясіння. При лабораторному обстеженні виявлено збільшення цукру в крові до 10 ммоль/л. захворювання якої ендокринної залози у хворої?

*** А) підшлункової**

- В) щитоподібної
- С) статевих
- Д) наднирникових
- Е) епіфіза

79. У хворого з порушенням кровобігу в малому колі, при обстеженні виявили збільшення правої межі серця. Де у нормі вона виявляється?

*** А) Від III до V реберних хрящів (праворуч на 1-2 см від правого краю стернової кістки).**

- В) Від II до VI реберних хрящів (ліворуч на 1-2 см від правого краю стернової кістки).
- С) Від III до VI реберних хрящів (праворуч на 2-3 см від правого краю
- Д) Від III до V реберних хрящів (ліворуч на 1-2 см від правого краю стернової кістки).
- Е) Від III до VI ребра по правої середньоключичній лінії.

80. Хвора Б., 39 років, яка на протязі 8 років не може завагітніти порадили звернутись до ендокринолога. При обстеженні у хворої виявлено екзофтальм, тремор повік, тахікардію. Захворювання якої ендокринної залози супроводжується такими симптомами?

*** А) щитоподібної**

- В) підшлункової
- С) статевих
- Д) наднирникових
- Е) епіфіза

81. До лікаря звернулася мати син якої за літо виріс на 18см. При обстеженні хлопця 12 років: зріст – 180 см, вага 68 кг. З порушенням діяльності якої ендокринної залози це пов'язано?

*** А) гіпофіза**

- В) щитоподібної
- С) статевих
- Д) наднирникових
- Е) епіфіза

82. У приймальне відділення лікарні привезли хвору, яка втратила на вулиці свідомість. При обстеженні виявлено запах ацетону з рота. Який попередній діагноз можна поставити?

*** А) діабетична кома**

- В) печінкова кома
- С) уремічна кома
- Д) цироз печінки
- Е) внутрішня кровотеча

83. Хвора Б. 50 років скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали збільшуватись в розмірі. Гіперфункція якої залози дасть подібні симптоми?

*** А) гіпофіза**

- В) щитоподібної
- С) статевих
- Д) наднирникових
- Е) епіфіза

84. При рентгенологічному обстеженні на знімку визначається вроджений розтір правих ніжок дуг І-ІІ грудних хребців. Що можна діагностувати у хворого?

*** А) Spina bifida.**

- В) Перелом основи черепа.
- С) Грудний кіфоз.
- Д) Грудний лордоз.
- Е) Перелом дуг І-ІІ грудних хребців.

85. При огляді дитини 10 років педіатр виявив у грудному відділі вигин хребетного стовпа вліво. Який діагноз можна виставити пацієнту?

*** А) Лівороторонній грудний сколіоз.**

- В) Правоторонній поперековий сколіоз.
- С) Грудний лордоз.
- Д) Шийний кіфоз.
- Е) Поперековий лордоз.

86. До травмпункту міської клінічної лікарні звернувся пацієнт зі скаргами на те, що після стрибка з висоти гомілка запрокидується вперед і не вертається у вихідне положення. Який діагноз можна виставити?

*** А) Розрив ахілова сухожилка.**

- В) Відсутність латеральної голівки m. gastrocnemius.
- С) Перелом великогомілкової кістки.
- Д) Перелом малогомілкової кістки.
- Е) Розрив підшовного м'яза.

87. Після падіння на вулиці у жінки 45 років ліва рука обвисла, рухи дуже болючі в ділянці плечового суглоба. Який попередній діагноз виставив після огляду лікар швидкої медичної допомоги?

*** А) Перелом хірургічної шийки плечової кістки.**

В) Перелом променевої кістки.

С) Перелом ліктьової кістки.

Д) Перелом блока плечової кістки.

Е) Перелом проксимальної фаланги мізинця.

88. Після опіку правої руки в реабілітаційному періоді у пацієнта не розгинається мізинець. Про пошкодження якого м'яза можна думати?

*** А) Розгинач мізинця.**

В) Супінатор.

С) Плечовий м'яз.

Д) V червоподібний м'яз.

Е) Довгий долонний м'яз.

89. У хворого спостерігається втрата загальної чутливості на окремих ділянках тіла справа. Яка із звивин великих півкуль головного мозку уражена ?

*** А) Зацентральна.**

В) Верхня скронева.

С) Середня скронева.

Д) Нижня скронева.

Е) Перед центральна

90. Внаслідок вивиху нижньої щелепи у пацієнта спостерігається відсутність відчуття смаку передньою частиною язика та слюзовиділення. Подразненням якого нерва це викликано?

*** А) Лицевого**

В) Під'язикового.

С) Нижньощелепного.

Д) Блукаючого.

Е) Барабанного.

91. У хворого спостерігається параліч м'язів верхньої і нижньої кінцівок зліва. Яка із звивин великих півкуль головного мозку уражена ?

*** А) Передцентральна.**

В) Середня лобова.

С) Нижня лобова.

Д) Верхня лобова.

Е) Зацентральна.

92. Хворий не розуміє змісту слів, а також не розуміє власної мови (словесна глухота). Яка із звивин великих півкуль головного мозку уражена ?

*** А) Верхня скронева.**

В) Нижня лобова.

С) Зацентральна.

Д) Верхня тім'яна долька.

Е) Нижня тім'яна долька.

93. В дорожньо-транспортній пригоді у потерпілого пошкоджена нижня кінцівка, на рівні верхньої третини гомілки. Після чого на травмованій кінцівці стало неможливим тильне розгинання стопи. Який нерв пошкоджений?

*** А) Глибокий малогомілковий нерв.**

- В) Спільний малогомілковий нерв.
- С) Великогомілковий нерв.
- Д) Поверхневий малогомілковий нерв.
- Е) Сідничний нерв

94. Після травми передньої поверхні верхньої третини передпліччя у хворого порушена пронація, ослаблене долонне згинання кисті і порушена чутливість шкіри 1,2,3-го та променевої сторони 4-го пальців долонної поверхні та шкірі нігтьової і серединної фаланг тильної поверхні 2,3,4 пальців. Який нерв уражений при порушенні вказаних функцій?

*** А) Серединний нерв у верхній третині передпліччя**

- В) Ліктьовий нерв
- С) Променевий нерв
- Д) М'язово-шкірний нерв
- Е) Присередній шкірний нерв передпліччя

95. В клініку поступив чоловік 54 років зі скаргами на болі у правій підреберній ділянці, рвоту з кров'ю. При дослідженні виявлено збільшення розмірів печінки, варікозне розширення вен стравоходу і шлунка, кровотечу з них. Порушення функції якої судини мало місце

*** А) Воротної вени**

- В) Черевної аорти
- С) Печінкової вени
- Д) Нижньої порожнистої вени
- Е) Верхньої порожнистої вени

96. У хворої 45 років інфаркт передньої стінки лівого шлуночка. В басейні якої судини виникло порушення кровообігу?

*** А) Передньої міжшлуночкової гілки лівої вінцевої артерії.**

В) Передсердно-шлуночкових гілок правої вінцевої артерії.

С) Огинаючої гілки лівої вінцевої артерії.

Д) Задньої міжшлуночкової гілки правої вінцевої артерії.

Е) Передсердно-шлуночкова гілки лівої вінцевої артерії.

97. Потерпілий доставлений у лікарню з переломом нижньої щелепи та значною кровотечею у ділянці перелому. Пошкодження якої артерії вірогідніше всього мало місце?

*** А) Нижньої коміркової артерії**

В) Лицевої артерії

С) Язикової артерії

Д) Висхідної піднебінної артерії

Е) Верхньої коміркової артерії

98. У хворого 68р. після закритої травми грудної клітки появились скарги на біль у грудній клітці з іррадіацією у спину. При рентгенологічному дослідженні у прямій проекції виявлено зміщення лівого легеневого поля за рахунок розширення серцево-судинної тіні, яка має рівні і чіткі контури. Аневризма якої судини утворилася?

*** А) Грудної частини аорти**

В) Верхньої порожнистої вени

С) Нижньої порожнистої вени

Д) Непарної вени

Е) Висхідної частини аорти

99. У хворого діагностований перелом хірургічної шийки плечової кістки. Яка артерія може бути пошкоджена при транспортуванні без іммобілізації?

*** А) Задня огибаюча артерія плеча**

В) Передня огибаюча артерія плеча

С) Пахвова артерія

Д) Плечова артерія

Е) Глибока артерія плеча

100. Статистично встановлено, що водянка калитки частіше зустрічається ліворуч. Однією з причин цього є відмінне впадіння v.testicularis sinstra. В яку з наведених судин впадає ця вена.

*** А) Ниркова вена**

В) Внутрішня клубова вена

С) Нижня брижова вена

Д) Селезінкова вена

Е) Нижня порожниста вена

101. У новонародженого під час сечовиділення з сечового міхура спостерігається виділення сечі із пупка. Чим обумовлене це явище?

*** А) незарощення сечової протоки**

В) незарощення жовточної протоки

С) неповна нориця

Д) ектопія устя сечовода

Е) дивертикул сечового міхура

102. В лікарню поступив чоловік 40 років з травмою нирки. З метою видалення нежиттєздатних тканин та відновлення кровоносних судин показана резекція одного сегмента нирки. Скільки сегментів має нирка?

*** А) 5**

В) 4

С) 3

Д) 2

Е) 6

103. При ультразвуковому дослідженні нирок у хворої виявлено їх опущення. В анамнезі схуднення на 10 кг. Послаблення якого з факторів фіксуючого апарату нирок призвело до цього порушення?

*** А) жирової капсули**

В) волокнистої капсули

С) очеревини

Д) ниркових артерій і вен

Е) великого поперекового м'язу

104. Хворий скаржиться на болі у поперековій ділянці, підвищення артеріального тиску. У загальному аналізі сечі в значній кількості білок і еритроцити. На пошкодження якої частини нефрону вказують дані цього дослідження?

*** А) клубочок капілярів**

В) проксимальний звивистий каналець

С) проксимальний прямий каналець

Д) тонкий сегмент

Е) дистальний прямий каналець

105. При цистоскопії у нормі слизова оболонка сечового міхура утворює складки за винятком однієї ділянки трикутної форми, де слизова оболонка гладка. В якій частині сечового міхура знаходиться цей трикутник?

- * А) дно міхура**
- В) шийка міхура
- С) верхівка м
- Д) тіло м
- Е) перешийок м

106. Жінка 25 років госпіталізована в гінекологічне відділення з метою операції з приводу пухлини яєчника. При здійсненні операції необхідно розсікати зв'язку, що з'єднує яєчник з маткою. Яку саме?

- * А) lig. ovarii proprium**
- В) lig. cardinale
- С) lig. latum uteri
- Д) lig. suspensorium ovarii
- Е) lig. umbilicale laterale

107. Після значного похудіння у чоловіка 70 років з'явились тупі болі в поперековій ділянці. При обстеженні був виставлений діагноз: "Блукаюча нирка". Яка частина фіксуючого апарату нирки вірогідніше всього була уражена?

- * А) capsula adiposa**
- В) capsula fibrosa
- С) m. iliopsoas
- Д) lig. hepatorenalis
- Е) m. quadratus lumborum

108. Чоловік 35 років звернувся до лікаря із скаргами на біль та припухлість правого яєчка. При обстеженні була виявлена пухлина, що потребує операції, при якій необхідно розсікати 7 шарів калитки до білкової оболонки. Яка оболонка буде розсічена останньою перед білковою оболонкою?

*** A) tunica vaginalis testis**

B) tunica spermatica externa

C) tunica dartos

D) tunica spermatica interna

E) cutis orchis

109. До лікаря звернулась мати новонародженого, у якого було виявлено вроджену пахвинну килу. Пахвинний канал був настільки широкий, що внутрішні органи виходили в калитку. Показана операція по ушиванню каналу. Що є задньою стінкою пахвинного каналу?

*** A) fascia transversaria**

B) lig. inguinale

C) апоневроз m. obliquus abdominis externus

D) Края mm. obliquus abdominis externus et transversus

E) obliquus abdominis internus

110. Під час пологів у жінки 25 років відбувся розрив тканин промежини. Для усунення цієї травми необхідно накласти шви, в т.ч. і на м'язи. Який м'яз промежини слід зшити?

*** A) m. transversus perinei superficialis**

B) m. ischiocavernosus

C) m. bulbospongiosus

D) m. levator ani

E) m. sphincter ani externus

111. Пацієнт не відчуває смаку передніми двома третинами язика. Гілка якого черепного нерва ушкоджена?

*** A) VII**

B) VIII

C) IX

D) X

E) XI

112. Після травми обличчя у хворого гематома щічної ділянки. Відтік з якої слинної залози блоковано гематомою?

*** A) привушна**

B) під'язикова

C) піднижньощелепна

D) губна

E) щічна

113. Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка стравоходу зазнала найбільших пошкоджень?

*** A) слизова**

B) м'язова

C) серозна

D) еластична мембрана

E) м'язова і серозна

114. Ендоскопія ДПК показала порушення виділення жовчі у просвіт кишки. Виявлена патологія знаходиться в якому відділі ДПК?

*** А) низхідна частина**

- В) цибулина
- С) верхня горизонтальна частина
- Д) нижня горизонтальна частина
- Е) висхідна частина

115. При дослідження жовчний міхур переповнений жовчю. Яка ділянка зовнішньо-печінкових жовчних ходів патологічно змінена?

*** А) загальна жовчна протока**

- В) міхурова протока
- С) загальна печінкова протока
- Д) ліва дольова протока
- Е) права дольова протока

116. В клініку звернувся чоловік 45 років із скаргами на втрату чутливості в ділянці задньої 1/3 язика. Функція якої пари черепно-мозкових нервів порушена?

*** А) IX**

- В) X
- С) VIII
- Д) V
- Е) XII

117. До ЛОР-лікаря звернувся жінка 48 років, яка працює на хімічному виробництві, із скаргами на порушення нюху. Яке анатомічне утворення ймовірно всього уражене?

*** A) regio et fila olfactoria**

- B) tractus olfactorius
- C) bulbus olfactorius
- D) trigonum olfactorium
- E) uncus

118. Після травми скроневої ділянки голови у хворого погіршився нюх. Порушення функції якого анатомічного утворення спостерігається?

*** A) uncus**

- B) tractus olfactorius
- C) fila olfactoria
- D) trigonum olfactorium
- E) bulbus olfactorius

119. Хвора 27 років звернулась зі скаргами на погіршення зору. При огляді виявлено порушення акомодатії, зіниця розширена, не реагує на світло. Функція яких м'язів порушена?

*** A) m. sphincter pupillae, m. ciliaras**

- B) m. dilatator pupillae
- C) m. obliquus superior, m. ciliaras
- D) m. rectus lateralis, m. sphincter pupillae
- E) mm. sphincter et dilatator pupillae

120. До лікаря звернулась жінка 54 років із скаргами на паморочення, нудоту, порушення рівноваги після падіння і травми голови. Порушення функції якої структури внутрішнього вуха ймовірніше всього було?

*** A) organum vestibulare**

B) labyrinthus osseus

C) organum spirale

D) membrana tympani

E) canalis longitudinalis modiolil

121. У хворого фронтит. З анамнезу відомо, що в нього було запалення верхньощелепної пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобну пазуху?

*** A) із середнього носового ходу**

B) із верхнього носового ходу

C) із нижнього носового ходу

D) із присінка носової порожнини

E) із решітчасто-клиноподібної кишені

122. Хворому з пухлиною гортані показана ургентна операція. Який хрящ повинен розітнути хірург при здійсненні операції?

*** A) перснеподібний**

B) щитоподібний

C) черпакуватий

D) клиноподібний

E) перснеподібний та черпакуватий

123. В клініку госпіталізована пацієнтка із пухлиною, розташованою у середній долі правої легені. Показана операція. Яку найбільшу кількість сегментів можна видалити у складі цієї долі??

*** А) 2**

В) 3

С) 4

Д) 5

Е) 1

124. Дитина 3-х років поступила у лікарню з інохідним тілом у бронхах. В який бронх вірогідніше всього потрапило інохідне тіло?

*** А) в правий головний бронх**

В) в лівий головний бронх

С) в правий сегментарний бронх

Д) в лівий сегментарний бронх

Е) в дольковий бронх

125. Хворий поступив з діагнозом плеврит. На рентгенограмі виявлено наявність ексудата на рівні середньої пахвової лінії. В якому місці плевральної порожнини знаходиться максимальна кількість ексудата?

*** А) у реберно-діафрагмальному синусі**

В) біля кореня легені

С) у діафрагмально-медіастинальному синусі

Д) у реберно-медіастинальному синусі

Е) у ділянці купола легені

126. Жінці 58-ми років проведено повне видалення матки з придатками, після чого виділення сечі припинилося. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з устів сечоводів сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено при операції?

*** A) D. Ureter**

- B) Pelvis renalis
- C) Uretra
- D) Vesica urinaria
- E) Ren

127. Хворий скаржиться на порушення чутливості шкіри в медіальній частині тильної та долонної поверхні кисті. Який з нервів ушкоджений?

*** A) A. = N. ulnaris**

- B) N. radialis
- C) N. medianus
- D) N. musculocutaneus
- E) N. cutaneus antebrachii medialis

128. У чоловіка 52-х років при піднятті надмірної ваги виникло грижове вип'ячування в здухвинній ділянці. Через яке анатомічне утворення ймовірно все виникло грижове вип'ячування?

*** A) C. Canalis inguinalis**

- B) Anulus umbilicalis
- C) Anulus femoralis
- D) Linea alba
- E) Lig. Inguinalis

129. Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в футбол отримав удар в ділянці лівого підребер'я. Ушкодження якого з органів, що проєктуються в дану ділянку, може спричинити сильну кровотечу.

*** A) D. Lien**

- B) Cauda pancreatis
- C) Fundus ventriculi
- D) Flexura coli sinistra
- E) Ren sinistra

130. У новонародженого при першому годуванні виявлено витікання молока з носа. Який природжений дефект ротової порожнини може зумовлювати таке ускладнення?

*** A) Розщеплення верхньої губи "заяча губа"**

- B) Розщеплення піднебіння "вовча паща"
- C) Розщеплення алвеолярного відростка
- D) Відсутність піднебінної завіси
- E) Це нормальне явище

131. Хирургу необхідно розтягти у хворого гнійник привушної слинної залози. Чому не можна для цього застосувати вертикальні розрізи?

*** A) Можна пошкодити головну вивідну протоку привушної залози**

- B) Можна пошкодити привушне сплетення
- C) Можна пошкодити жувальний м'яз
- D) Можна пошкодити скроневу артерію
- E) Можна пошкодити щічний м'яз

132. У дітей часто можна спостерігати затруднене носове дихання, яке пов'язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?

- * A) Tonsilla pharyngea**
- B) Tonsilla palatina
- C) Tonsilla lingualis
- D) Tonsilla tubaria
- E) Усіх названих мигдаликів

133. До лікарні доставили хворого з тяжким хімічним опіком стравохода. Через деякий час у хворого з'явилися симптоми запалення очеревини. В якій частині стравохода його стінка пошкоджена найбільше?

- * A) В черевній**
- B) В шийній
- C) В грудній
- D) В шлунковій
- E) В загруднинній

134. При оперативному втручанні в черевній порожнині хірургу необхідно проникнути в чепцеву (сальникову) сумку. Як може проникнути хірург в цю частину порожнини очеревини, не порушуючи цілісність малого чепця (сальника)?

- * A) Через чепцевий (сальниковий) отвір**
- B) Через праву біляободову борозну
- C) Через ліву біляободову борозну
- D) Через правий брижовий синус
- E) Через лівий брижовий синус

135. До лікарні доставлено пораненого вогнепальною зброєю з сильною кровотечею. При огляді хірургом установлено, що кульовий канал пройшов через передню стінку живота, склепіння шлунка і вийшов на рівні IX ребра по лівій серединній пахвинній лінії. Який орган постраждав разом з пораненням шлунка?

*** A) Селезінка**

- B) Ліва нирка
- C) Підшлункова залоза
- D) Поперечна ободова кишка
- E) Ліва частка печінки

136. До лікаря звернувся пацієнт із скаргами на підвищену больову чутливість шкіри вушної раковини та зовнішнього слухового проходу. Пальпація позаду грудинно-ключично-сосковидного м'язу боляча. Подразнення якого з нервів може дати таку клінічну картину?

*** A) N. auricularis magnus.**

- B) N. transversus colli.
- C) N. occipitalis minor.
- D) Nn. supraclaviculares.
- E) N. vagus.

137. Випадково стукнувшись ліктем об стіл, хворий відчув пекучість і поколювання на внутрішній поверхні передпліччя. Який нерв був травмований в цьому випадку?

*** A) N. ulnaris.**

- B) N. radialis.
- C) N. medianus.
- D) N. axillaris.
- E) N. musculocutaneus.

138. Після травми м'яких тканин в області задньої поверхні медіального виростка плеча у постраждалого виникло відчуття поколювання шкіри медіальної поверхні передпліччя. Який з названих нервів знаходиться в зоні ушкодження?

*** A) N.ulnaris.**

B) N.radialis.

C) N. musculocutaneus.

D) N. dorsalis scapularis.

E) N. subscapularis.

139. При запаленні глибоких лімфатичних вузлів пахвової області хірург повинен був розкрити глибоко розміщений гнійник. Після операції хворий втратив здатність згинати передпліччя в ліктьовому суглобі та порушилася шкірна чутливість передньо-бічної поверхні передпліччя. Якого нерва було ушкоджено при оперативному втручанні?

*** A) N.musculocutaneus.**

B) N.radialis.

C) N.ulnaris.

D) N.medianus.

E) N.axillaris.

140. У постраждалого в дорожній пригоді лікар виявив перелом лівої ключиці і порушення кровообігу в кінцівці (немає пульсації в променевої артерії. Яка з причин порушення кровообігу в кінцівці найбільш ймовірна?

*** A) Здавлення підключичної артерії.**

B) Здавлення пахвової артерії.

C) Здавлення підключичної вени.

D) Здавлення хребтової артерії.

E) Здавлення пахвової вени.

141. Рентгенологічно у хворого виявлені збільшені лімфатичні вузли в ділянці кореня легень. Хворий скаржиться на уповільнення серцевого ритму і больові явища в серці. Лікар вважає, що симптоми з боку сторони серця викликані тиском на його нерви збільшених вузлів. Які з нервів здавлюються збільшеними лімфатичними вузлами?

*** A) Rr.cardiaci n. vagi.**

B) N.phrenicus.

C) Nn.intercostales.

D) Truncus sympathicus.

E) N. splanchnicus major

142. Визначення розмірів печінки дозволило встановити, що по правій середньоключичній лінії верхня її межа знаходиться на рівні IV міжребер'я, нижній її край виступає з під реберної дуги на 4 см. Оцініть розміри печінки.

*** A) Е. Печінка збільшена - нижня її межа зміщена донизу.**

B) Розміри печінки нормальні.

C) Печінка зменшена - нижня її межа зміщена донизу.

D) Печінка зменшена - нижня її межа зміщена догори.

E) Печінка збільшена - верхня її межа зміщена догори.

143. Що утворює задній серцево-судинний контур тіні серця при його рентгенологічному дослідженні в лівому сосковому положенні?

*** A) Ліве передсердя, лівий шлуночок.**

B) Висхідна частина аорти, лівий шлуночок.

C) Висхідна частина аорти, ліве передсердя.

D) Легеневий стовбур, лівий шлуночок.

E) Легеневий стовбур, ліве передсердя.

144. Чоловік 42 років звернувся до медпункта з приводу різаної рани нижньої частини передньої поверхні плеча. Об'єктивно: затруднене згинання передпліччя. Які з названих м'язів ймовірно ушкоджені у хворого?

*** А) M. brachialis, m. biceps brachii.**

В) M. biceps brachii, m. anconeus.

С) M. coracobrachialis, m. supraspinatus.

Д) M. deltoideus, m. infraspinatus.

Е) M. deltoideus, m. biceps brachii.

145. До травматологічного відділення доставлено чоловіка з закритою травмою живота праворуч та підозрою на розрив печінки. В якому з приведених утворень очеревини слід чекати скопичення крові?

*** А) В прямокишково-міхуровій заглибині.**

В) В лівій приободовій борозні.

С) В верхньому клубово-сліпокишковому заутку.

Д) В міжсигмовидному заутку.

Е) В сальниковій сумці.

146. Трикутник шиї обмежений ззаду грудинноключичнососковидним м'язом, зверху-заднім черевцем двочеревцевого м'яза, зпереду - верхнім черевцем лопатковопід'язикового м'яза. Назвіть цей трикутник.

*** А) Сонний.**

В) Підщелепний.

С) Лопатковотрахейний.

Д) Лопатковоключичний.

Е) Лопатковотрапецієвидний.

147. В яке з утворень черепа буде поширюватися крововилив, якщо зруйнована венозна судина в області яремного отвору?

*** А) Задня черепна ямка**

- В) Передня черепна ямка.
- С) Субарахноїдальний простір.
- Д) Середня черепна ямка.
- Е) Субдуральний простір.

148. У потерпілого після травми голови була порушена цілісність піраміди скроневої кістки. Лінія перелому пройшла перпендикулярно вісі піраміди, латеральніше від внутрішнього слухового отвору. Який канал скроневої кістки вірогідно буде зруйнованим?

*** А) Напівколові канали лабіринту.**

- В) Соскоподібний канал.
- С) Барабанний каналець.
- Д) Каналець барабанної струни.
- Е) Лицевий канал.

149. Внаслідок пухлини гіпофіза при рентгенографії виявлено руйнування і збільшення ямки турецького сідла. Яка кісткова порожнина при цьому вражена?

*** А) Лицевий канал.**

- В) Сонний канал.
- С) Зоровий канал.
- Д) Барабанна порожнина.
- Е) Пазуха клиновидної кістки.

150. Який нерв вражено, якщо у хворого права носогубна складка розглажена, розширена права очноямкова щілина (її не вдається закрити під час примружування, тому що повіки не змикаються), виникають затруднення під час розмови і приймання їжі (їжа застряє між щокою і зубами)?

*** A) N. facialis dexter.**

B) N. abduceus dexter.

C) N. glossopharyngeus sinister.

D) N. vagus dexter.

E) N. trigeminus dexter.

151. У потерпілого є травма м'яких тканин та тім'яних кісток в області стрілоподібного шва, яка супроводжується сильною кровотечею? Яке з утворень вірогідно ушкоджено?

*** A) Sinus sagittalis superior.**

B) Sinus petrosus superior.

C) Sinus rectus.

D) Sinus sagittalis inferior.

E) Sinus transversus.

152. Лікар прогнозує можливість запалення клітковини орбіти при гнійному запаленні в ділянці підочноямкового отвору. Через яке з утворень можливе поширення інфекції?

*** A) Canalis infraorbitalis.**

B) Canalis pterigoideus.

C) Canalis nosolacrimalis.

D) Canalis incisivus.

E) Fissura orbitalis inferior.

153. У хворого запалення середнього вуха (отит). При цьому він скаржиться на розлад сприймання смаку в передній частині язика. Який з нервів постраждав?

*** A) N.facialis.**

B) N.vestibulo-cochlearis.

C) N.trigeminus..

D) N.vagus.

E) N.glossopharyngeus.

154. При огляді травмованого у дорожній пригоді лікар встановив ураження зовнішньої стінки очної ямки. Потерпілий втратив можливість відведення очного яблука на травмованій стороні. Який нерв міг бути ураженим у даному випадку?

*** A) N.abducens.**

B) N.trochlearis.

C) N.oculomotorius.

D) N.opthalmicus.

E) N. infraorbitalis..

155. До лікаря звернувся хворий зі скаргою на затруднення щільного змикання щелеп при жуванні. Лікар встановив атрофію жувальних м'язів, розміщених нижче виличної дуги. Гілки якого черепного нерва інервують вказану групу м'язів?

A) N.opthalmicus.

B) N.glossophryngeus.

*** C) N.trigeminus (III гілка).**

D) N.vagus.

E) N.facialis.

156. У хворого пухлина в ділянці верхнього носового ходу. Порушення яких функцій можна очікувати?

*** A) Порушення нюху.**

- B) Порушення дихання.
- C) Порушення ковтання.
- D) Порушення слиновідділення.
- E) Порушення смаку.

157. У хворого при висуванні язика спостерігається відхилення його верхівки вліво. Рухова інервація якого черепного нерву порушена у цьому випадку?

*** A) N.hypoglossus dexter.**

- B) N.glossopharyngeus dexter.
- C) N. vagus dexter.
- D) N. trigeminus sinister.
- E) N.facialis sinister

158. У хворого знижений слух на ліве вухо. В якому утворенні локалізовані ядра ураженого нерва?

*** A) Fossa rhomboidea**

- B) Medulla oblongata..
- C) Pedunculi cerebelli.
- D) Pedunculi cerebri..
- E) Thalamus opticus.

159. Які з названих нервів можуть пошкоджуватись при гайморитах та оперативних втручаннях на гайморовій порожнині?

*** A) Nn. alveolares superiores.**

B) N. facialis..

C) N. mandibularis.

D) N. oculomotorius.

E) N. trochlearis.

160. В результаті травми черепа з пошкодженням верхньої стінки правої очної ямки потерпілий втратив можливість піднімати верхню повіку правого ока і дивитися угору. Який нерв вірогідно пошкоджений?

*** A) R. superior n.oculomotorius.**

B) R. inferior n.oculomotorius.

C) N. trochlearis

D) N. abducens.

E) N. ophthalmicus.

161. При обстеженні у хворого виявлено відсутність зору в присередніх половинах полів зору обох очей. Яка частина зорового шляху вірогідно ушкоджена?

*** A) D. Chiasma opticus**

B) N. opticus.

C) Tractus opticus.

D) Sulcus calcarinus.

E) Corpus geniculatum laterale

162. У хворого спостерігається біль та відчуття оніміння в слизовій ясен верхньої щелепи. Які з нервів можуть бути ушкоджені?

*** A) Nn. alveolaris superiores (n.maxillaris).**

- B) N.facialis
- C) N.glossopharyngeus
- D) N. vagus.
- E) N.ophtalmicus

163. Внаслідок операційної травми м'яких тканин шиї справа, порушилися регулярні рухові екскурсії правого куполу діафрагми. Який з нервів нервів вірогідно постраждав?

*** A) N. phrenicus dexter.**

- B) N. vagus
- C) N. accessorius
- D) Rr. dorsales nervi spinalis
- E) N. intercostales.

164. Хворий 38 років звернувся зі скаргами на болі в правій здухвинній ділянці, які особливо турбуються при ходьбі, фізичній нарузці. Болі стали турбувати останні 2 мвсвці. Рік еазад він переніс апендектомію. При огляді в правій ділянці післяопераційний рубець довжиною до 10 см. При пальпації визначається в ділянці рубця м'яко-елатичне пухлиноподібне утворення, яке вправляється в черевну порожнину через дефект в апоневнозі. Ваш діагноз?

*** A) Післяопераційна грижа**

- B) Пухлина сліпої кишки.
- C) Пухлина черевної порожнини.
- D) Кіста правого яєчника.
- E) Інфільтрат післяопераційного рубця.

165. В хірургічне відділення після аварії потрапив потерпілий з травматичним розривом селезінки, що потребує негайної операції. У якому утворенні очеревини вона розташована?

*** A) Bursa pregastrica**

B) Bursa hepatica

C) Bursa omentalis

D) Sinus mesentericus sinister

E) Sulcus paracolicus sinister

166. У хворого пухлиною пошкоджено піраміди довгастого мозку. У якому з провідних шляхів порушиться проведення нервових імпульсів?

*** A) Tr. corticospinalis**

B) Tr. corticonuclearis

C) Tr. corticopontinus

D) Tr. dentatorubralis

E) Tr. spinocerebellaris

167. У хворого 22 років, оперованого 16 годин тому з приводу гострого апендициту, паялась слабкість, головкружіння, температура в нормі. Хврий блідий, пульс 110, ритмічний, живіт м'який, болючий в ділянці операційної рани. В відлогих місцях живота при аперкусії визначається укорочення перкуторного звуку, границі його зміщується при повертанні хворого на бік. Лейкоцитів - 11400. Яке ускладнення Ви запідзрили?

*** A) Внутрішньочеревна кровотеча.**

B) Розлитий перитоніт

C) Місцевий перитоніт

D) Міжпетельний абсцес.

E) Кишкова непрохідність

168. Хворий 47 років поступив в клініку з приводу obturacійної кишкової непрохідності, викликаної пухлиною сігмовидної кишки. Стан середньої тяжкості. На операції знайдена пухлина сігми, рухома, видимих метастазів немає. Симптомів перитоніту немає, але привідний відділ кишки різко роздутий, заповнений кишковим вмістом, газами. Яка тактика в цій ситуації?

*** А) Резекція сігми, сігмостома.**

- В) Резекція сігми, анастома.
- С) Сігмостома, дронування черевної порожнини.
- Д) Тубаж кишечника.
- Е) Видалення пухлини

169. Хворий 38 років поступив в відділення третій раз за 2 роки з приводу шлункової кровотечі виразкової етіології. Застосуванням комплексу консервативних засобів кровотечу швидко спинено і протягом тижня стан хворого значно поліпшився. Яка Ваша тактика у лікуванні хворого?

*** А) Планова операція**

- В) Консервативне лікування
- С) Санаторно-курортне лікування.
- Д) Дієтотерапія і режим харчування
- Е) Протипрецидивне лікування двічі на рік

170. У хворій 30 років на фоні повного здоров'я раптово появилась дисфагія, болі за грудиною після ковтання їжі. Їжа проходила краще після запивання її теплою водою, молоком або чаєм. При різкому відкиданні голови і нахилі тулуба назад, хвора іноді відчувала, як їжа "провалювалася" в шлунок. Діагноз?

*** А) Кардіоспазм**

- В) Стриктурна стравоходу
- С) Рак стравоходу
- Д) Дивертикул стравоходу
- Е) Езофагіт

171. На операції у хворого 43 років з приводу гострого флегмонозного калькульозного холециститу, обмеженого перитоніту проведена холецистектомія від дна. З кукси пузирного протоку виділяється жовч, холедох до 1,5 см в діаметрі, набряклий інфільтрований. Зонд легко проходить в 12-палу кишку, але при операційній холангіографії в ретродуоденальній частині холедоха визначається округлої форми дефект до 0,7 см в діаметрі. Контраст вільно проходить в 12-палу кишку. Ваша хірургічна тактика?

*** А) Супрадуоденальна холедохотомія, видалення конкременту, дренування холедоха за Піковським.**

- В) Дренування холедоха за Вишневським, дренування черевної порожнини.
- С) Прошивання і перев'язка пузирного протоку.
- Д) Дренування черевної порожнини, ушивання до дренажів.
- Е) Дренування підпечінкової ділянки трубчато-гумовим дренажем.

172. В хірургічному відділенні лікується хворий 44 років з діагнозом- жовчнокам'яна хвороба, холедохолітіаз, механічна жовтяниця. Проведена консервативна терапія виявилась неефективною, жовтяниця наростає, сверблячка посилюється, болі відсутні. На УЗД в жовчному міхурі множинні тіні підвищеної ехоструктури, печінка мало збільшена. Холедох до 1,5 см в діаметрі, в нижній його частині - утворення до 1 см в діаметрі, також підвищеної ехоструктури. Ваша тактика?

*** А) Оперативне лікування.**

- В) Консервативне лікування.
- С) Динамічне лікування
- Д) Санаторно-курортне лікування
- Е) Дуоденальне зондування

173. Хворого 22 років на протязі 2 тижнів турбують ниючі в епігастральній ділянці оперізувального характеру, тошноти, за останні 2 дні – неодноразові рвоти. Стан хворого після рвоти не покращився. Відмічає затримку газів. При огляді: пульс 92, шкірні покриви ціаностичні, живіт здутий. При пальпації напруження м'язів немає. Болі локалізуються у ямці під грудьми і лівому ребернохребтовому куті. Ваш попередній діагноз?

*** А) Гострий панкреатит**

В) Гострий апендицит

С) Гострий холецистит

Д) Перфоративна виразка шлунку

Е) Хронічний гастрит

174. Хворий 43-х років поступив в клініку з приводу перфоративної виразки шлунку через 2 год. від початку захворювання. Виразковою хворобою хворіє 8 років. Багато разів лікувався в терапевтичному стаціонарі з короткочасним успіхом. При ревізії в пілоричному відділі шлунку виявлено перфоративний отвір 0,5х0,3 см. з невеликою інфільтрацією біля основи. Зі слів хворого – кислотність шлункового соку – 90. Яку операцію краще виконати?

*** А) Висілення виразки за Джадду, пілоропластика, проксимальна селективна ваготомія.**

В) Ушивання перфоративної виразки.

С) Накладання гасроентероанастомозу.

Д) Резекція шлунку

Е) Ушивання перфорації, стовбура ваготомія.

175. Хворий 58-років поступив в хірургічне відділення через 28 годин після перфорації виразки шлунку з вираженими явищами розлитого перитоніту. Стан хворого тяжкий. Оперований екстренно. Виразка з перфораційним отвором в центрі знаходиться в пілоричному відділі шлунку. При її ушиванні вихід із шлунку різко би звужувався, що загрожувало розвитку стенозу. Яке оперативне втручання Ви застосуєте в даному випадку?

*** А) Пластику сальником на ніжці за Опелем-Полікарповим.**

- В) Ушивання виразки
- С) Резекція шлунку.
- Д) Пластика ізомованим сальником
- Е) Ушивання виразки, ваготомія.

176. У хворої 50-років, яка поступила у хірургічне відділення на 4-добу від початку захворювання, діагноз гострого апендициту не викликав сумніву. Ні при пальпації, ні при вагінальному і ректальному обстеженні чітких даних про інфільтрат не одержано. Хвору вирішено оперувати. Розкрита черевна порожнина і знайдено апендикулярний інфільтрат. Які Ваші дії на операційному столі?

*** А) До інфільтрату підвести дренаж і рану зашити до дренажу.**

- В) Зшити лапаротомну рану наголухо
- С) Пунктувати інфільтрат
- Д) Провести апендектомію
- Е) Накласти ілеотрансверзанастомоз

177. Хворому 65-років протягом декількох років турбують приступи жовчно-кам'яної хвороби, черговий приступ не знявся до кінця. Протягом 2-місяців хвору продовжують турбувати ниючі болі у правому підребер'ї. При пальпації у правому підребер'ї визначається значних розмірів щільноеластичне, малоболоче утворення з гладкою поверхнею. Симптоми подразнення очеревини не визначається. Температура - нормальна, лейкоцитів у крові $6,6 \times 10^9$ /л. Ваш діагноз?

*** А) Водянка жовчного міхура.**

- В) Гострий холецистит
- С) Хронічний холецистит
- Д) Пухлина жовчного міхура
- Е) Пухлина товстої кишки

178. Хвора 40-років поступила в клініку з приводу гострого панкреатиту. Комплекс консервативних засобів не дав ефекту. Стан погіршився. Вирішено хвору оперувати. При ревізії - набряк підшлункової залози. Загальний жовчний проток розширений конкрементів в ньому немає. Жовчний міхур напружений, майже не опорожнюється, в ньому пальпуються конкременти - об'єм і характер операції?

*** А) Холицестиктомія, дренивання холедоха, сальникової сумки, черевної порожнини**

- В) Реакції підшлункової залози
- С) Холицестиктомія
- Д) Дренивання сальникової сумки
- Е) Дренивання холедоха

179. Хворий 52-років хворіє виразковою хворобою шлунку 15 років. Після неодноразового лікування в стаціонарі наступали ремісії, які тривали 1-2 роки. Останні 6 місяців, коли виникало чергове загострення захворювання, хворий відмічає, що стали болі більш інтенсивними і тривали, часто оперізуючими. При рентгенологічному обстеженні шлунково-кишкового тракту визначається “ніша” розміром 1,5 см. розміщена на задній стінці антрального відділу шлунку ближче до малої кривизни. Яке ускладнення виникло у хворого?

*** А) Пенетрація виразки в підшлункову залозу**

- В) Загострення виразкової хвороби
- С) Гострий панкреатит
- Д) Малігнізація виразки
- Е) Перфорація виразки

180. У хворого 36 -років, зранку з'явилися ниючі болі в правій здухвинній ділянці, які збільшувалися і ввечері стали позиви на сечопуск, підвищилася температура до 37,60, була однократна блювота. Живіт у правій здухвинній ділянці напружений, болючий. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний справа, позитивні симптоми Ровзінга, Сітковського. Симптом Пастернацького негативний. В сечі змін немає. Лейкоцитів – 14000. Ваш діагноз?.

*** А) Гострий апендицит**

- В) Кишкова коліка
- С) Ниркова коліка
- Д) Гострий холецистит
- Е) Кишкова непрохідність

181. Хворий 32-років звернувся зі скаргами на болі в правій здухвинній ділянці. Хворіє 6 днів. Спочатку, протягом 5-6 годин, болі локалізувались в епігастральній ділянці. Випорожнення в нормі. При огляді: язик вологий, температура 37,40С. В правій здухвинній ділянці невелика болючість. Напруження м'язів немає, але пальпується пухлиноподібне утворення. Позитивні симптоми Сітковського і Ровзінга. Симптом Щоткіна-Блумберга негативний. Лейкоцитів – 7800. Аналіз сечі – без особливостей. Діагноз?

*** А) Апендикулярний інфільтрат**

- В) Злоякісна сліпої кишки
- С) Пухлина нирки
- Д) Кишкова непрохідність
- Е) Гострий апендицит

182. У хворого 30 років 3 місяці тому виникла переміжна кульгавість через кожні 300-400 метрів, що спонукала його зупинятись через болі в литкових м'язах. На першому пальці правої ноги глибока некротична виразка. Гомілки мають блідо-мармурову окраску, дистальні частини ступнів синюшно-багряного забарвлення. Нігті пальців ступні ламкі та сухі. Пульс на артеріях ступні і гомілки відсутній, на підколінних – слабкий, на стегнових – чіткий. Яке захворювання у хворого?

*** А) Облітеруючий ендартеріїт нижніх кінцівок. III стадія. ХАН II ступеню**

- В) Облітеруючий атеросклероз артерій н/кінцівок. III стадія. Оклюзія стегново-підколінних сегментів
- С) Облітеруючий тромбангіїт н/кінцівок. III стадія
- Д) Післятромбоемболічний синдром н/кінцівок, варикозно-виразкова форма. ХВН III ступеню.
- Е) Гостра тромбоемболія підколінних артерій

183. У хворої 32 років, що хворіє природженою вадою серця та миготливої аритмією, раптово виникли різкі болі в лівій гомілці і ступні. Хвора обстежена через годину вдома. Вона стогне від болю, ступня і нижня третина гомілки бліді, холодні. Пальпація гомілки різко болюча, рухливість в гомілково-ступневому суглобі відсутня, поверхнева та глибока чутливість на ступні відсутні. Пульс на стегневій артерії чіткий, на підколінній артерії і на артеріях ступні - відсутній. Яке захворювання виникло у хворої?

*** А) Гостра емболія лівої підколінної артерії. Ішемія ПБ ступеню**

В) Тромбоз лівої стегневої артерії

С) Гострий тромбофлебіт глибоких вен лівої нижньої кінцівки

Д) Післятромбофлебітичний синдром лівої нижньої кінцівки

Е) Облітеруючий атеросклероз лівої н/кінцівки. Оклюзія стегново-підколінного сегменту

184. У хворої 30 років післяпологовий період ускладнився розвитком гострого здухвинно-стегневого венозного тромбозу лівої нижньої кінцівки.

Післяконсервативного лікування продоовжує утримуватись набряк лівої гомілки. Через півроку виникло варикозне розширення поверхневих вен, утворилась трофічна виразка на гомілці. Ваш діагноз?

*** А) Післятромбофлебітичний синдром лівої н/кінцівки, змішана форма. Хронічна венозна недост. III ступеню**

В) Варикозне розширення поверхневих вен лівої нижньої кінцівки

С) Гострий тромбофлебіт глибоких вен лівої нижньої кінцівки

Д) Трофічна виразка лівої гомілки

Е) Гострий тромбофлебіт поверхневих вен лівої нижньої кінцівки

185. У хворого з часто рецидивуючим мігруючим флеботромбозом виникла переміжна кульгавість, похолодіння нижніх кінцівок. Пульс на артеріях ступні відсутній, на підколінних і стегневих – чіткий. Ваш діагноз?

*** А) Облітеруючий тромбангіїт**

- В) Облітеруючий ендартеріїт. II стадія
- С) Гострий тромбофлебіт поверхневих вен н/кінцівок
- Д) Облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок, II стадія. Оклюзія гомілкових артерій
- Е) Гострий флеботромбоз глибоких вен нижніх кінцівок

186. Хвора 40 років хворіє варикозним розширенням поверхневих вен нижніх кінцівок . Два дні тому з'явилась болючість по ходу вен на правій гомілці. Вена пальпується у вигляді шнурка, потовщена. Шкіра над ними гіперемірована, набрякла. Набряк на ступні і гомілці відсутній. Поставте правильний діагноз.

*** А) Гострий тромбофлебіт варикозно розширених поверхневих вен правої нижньої кінцівки**

- В) Післятромбофлебітичний синдром правої нижньої кінцівки, варикозно-виразкова форма. ХВН II ступеню.
- С) Гострий лімфангіїт правої нижньої кінцівки
- Д) Гострий лімфостаз правої нижньої кінцівки
- Е) Бешиха правої гомілки

187. При обстеженні хворого з підвищеним внутрішньочерепним тиском, був виявлений недорозвиток отворів Мажанді (foramen Magendi) та Люшка (foramen Luschka). Що з'єднують ці апертури?

*** А) Порожнину IV шлуночка та мозочково-мозковий збірник**

- В) Порожнину IV шлуночка та canalis centralis спинного мозку
- С) Порожнину III шлуночка та бокових шлуночків мозку
- Д) Порожнину III шлуночка та збірник перехрестя
- Е) Порожнину III шлуночка та мозочково-мозковий збірник

188. Хвора 46 років скаржиться на поганий сон, схуднення, тремтіння рук, задишку та серцебиття, плаксивість. Хворіє 6 місяців. Об'єктивно: збуджена. Шкіра обличчя червона, покрита потом. Пульс аритмічний, 104 за 1 хв. АД 130/80 мм.рт.ст. Виражене тремтіння пальців рук. Зріст 173 см. Маса тіла 65 кг. Пальпуються обидві долі щитовидної залози рівномірно збільшені. Рівень трийодотіроніну крові /Т3/ 3,2 нг/мл, тіроксина /Т4/ - 210 нг/мл. Про вірогідність якого захворювання йдеться?

*** А) Тіреотоксичний зоб**

- В) Ревматизм
- С) Неврастенія
- Д) Міокардит
- Е) Арахноїдіт

189. Поранений 19-річний солдат скаржиться на біль в правій плечовій кістці, не може рухати правою рукою. Зі слів, 6 годин тому в результаті вибуху снаряду одержав осколочне поранення правої плечової кістки в верхній третині. Об'єктивно: стан задовільний, АТ- 120/70 мм.рт.ст., пульс 100 удхв. На латеральній поверхні правої плечової кістки в верхній третині рвана рана розміром 2,5 x 4,5 см, помірна кровотеча. Вихідного отвору немає, права плечова кістка деформірована, плече тепле, пульсація на судинах збережена.

*** А) Закрите сліпе осколочне поранення правого плеча в верхній третині з пошкодженням плечової кістки. Шок першого ступеня.**

- В) Вогнепальне поранення правого плеча з переломом правої плечової кістки.
- С) Відкрите вогнепальне поранення з пошкодженням м'яких тканин і судин правого плеча.
- Д) Вогнепальне поранення нижньої третини правого плеча.
- Е) Осколочне поранення правого плеча. Шок другого ступеня.

190. В хімічному осередку. При хімічному нападі протигаз одягнув із запізненням. Через 10 хвилин відчув стиснення та біль в області грудної клітки, симптоми загальної інтоксикації (слабкість, головний біль, нудота, блювання), астматичні приступи ядухи, приступи задишки, гіперсалівація, ціаноз, звуження зрачків. Тремор, фібрилярні посмикування м'язів, підвищення сухожильних рефлексів. Відчуття страху. Емфізема.

*** А) Інгаляційне враження зарином. Бронхоспастичний ступінь.**

В) Інгаляційне враження синильною кислотою. Середнього ступеня.

С) Важка форма враження фосгеном. Стадія прихованих явищ.

Д) Блискавична форма враження зоманом.

Е) Отруєння чадним газом. Середній ступінь.

191. У хворого, 26 років, виявлений великий фурункул м'яких тканин обличчя біля кореню носу та нижньої повіки. Грізним ускладненням цього захворювання може бути розповсюдження інфекції по венозним сполученням цього регіону до пазух твердої мозкової оболонки. Яка з пазух найбільш вірогідно може бути уражена?

*** А) Печеріста пазуха**

В) Верхня сагітальна пазуха

С) Потилична пазуха

Д) Сигмовидна пазуха

Е) Верхня кам'яниста пазуха

192. У хворого хлопчика, 10 років, виявлене сполучення серозної порожнини яєчка з очеревинною порожниною, що потребує оперативного втручання на сім'яному канатіку. Яка з оболонок сім'яного канатіка має бути розтиненою останньою, щоб виділити його змістовність?

*** A) Fascia spermatica interna.**

- B) Fascia spermatica externa
- C) Tunica vaginalis (lamina parietalis)
- D) Fascia cremasterica
- E) Tunica vaginalis (lamina visceralis)

193. До лікаря - ендокрінолога звернулася мати дівчинки 9 років зі скаргами на збільшення молочних залоз, кров'яністі виділення з піхви, посиленого росту волосся на тілі та навколо зовнішніх статевих органів. Яка з ендокринних залоз вражена (що гальмує передчасне статеве визрівання)?

*** A) Epiphysis cerebri**

- B) Hypophysis cerebri
- C) Gl. thyroidea
- D) Gl. suprarenalis
- E) Gl. parathyroidea

194. У хворого виявлене руйнування стінки барабанної порожнини з розповсюдженням гною до задньої черепної ямки. Яка з стінок зруйнована?

*** A) Paries mastoideus**

- B) Paries membranaceus
- C) Paries labyrinthicus
- D) Paries tegmentalis
- E) Paries jugularis

195. При обстеженні дитини 3 років, виявлена вроджена глаукома (збільшення внутрішньоочного тиску). Патологія розвитку яких структур очного яблука викликає це захворювання?

*** A) lig. pectinatum iridis**

- B) M. ciliare
- C) Corpus vitreum
- D) lens.
- E) Zonula ciliaris

196. При обстеженні хворого, виявлене новоутворення в білій речовині півкуль великого мозку з локалізацією у коліні та передньому відділі задньої ніжки внутрішньої капсули. Волокна якого провідного шляху мозку будуть зруйновані?

*** A) Tr. pyramidalis**

- B) Tr. frontothalamicus
- C) Tr. thalamocorticalis
- D) Tr. frontopontinus
- E) Tr. parietooccipitopontinus

197. При обстеженні хворого, виявлене новоутворення в білій речовині півкуль великого мозку з локалізацією у коліні та передньому відділі задньої ніжки внутрішньої капсули. Волокна якого провідного шляху мозку будуть зруйновані?

*** A) Tr. pyramidalis**

- B) Tr. frontothalamicus
- C) Tr. thalamocorticalis
- D) Tr. frontopontinus
- E) Tr. parietooccipitopontinus

198. При обстеженні підлітка, лікарем виявлена вроджена вада серця - функціонування боталової протоки. Що з'єднує ця протока у внутрішньоутробному періоді розвитку?

*** А) Легеневий стовбур та аорту**

- В) Правий та лівий шлуночок
- С) Аорту та нижню порожисту вену
- Д) Праве та ліве передсердя
- Е) Легеневий стовбур та верхню порожисту вену

199. Про сполуку гілок яких судин у медіальній частині стегового отвіру (annulus femoralis) повинен пам'ятати хірург для запобігання масивної кровотечі (при 30% її збільшенню розвитку)?

*** А) obturatoria et a. epigastrica inferior**

- В) a. femoralis et a. epigastrica inferior
- С) obturatoria et a. epigastrica superior
- Д) a. femoralis et a. obturatoria
- Е) a. umbilicalis et a. femoralis

200. Від якого органу лімфа безпосередньо може відходити до грудної протоки, минаючи регіональні лімфатичні вузли, що визиває дуже швидке метастазування пухлин та різко погіршує прогноз хворого?

*** А) Стравохід**

- В) Легені
- С) Глотка
- Д) Шлунок
- Е) Трахея

201. В хірургічне відділення поступив хворий з ножевим пораненням грудної клітини справа та пневмотораксом (проникнення повітря у плевральну порожнину). Перкуторно нижня межа правої легені по середньоключичній лінії піднялася на рівень III ребра. Де у нормі вона повинна обстежуватися?

*** A) VI ребро**

B) VII ребро

C) VIII ребро

D) IX ребро

E) V ребро

202. В реанімаційне відділення поступив хворий з тяжким отруєнням. Для проведення комплексу лікування необхідно виконати катетерізацію та введення лікарських речовин до підключичної вени. У якому топографічному утворенні вона знаходиться?

*** A) Spatium antescalenum**

B) Spatium interscalenum

C) Spatium retrosternocleidomastoideus

D) Spatium interaponeuroticum suprasternale

E) Trigonum omotracheoideum

203. Хворий після травми скаржиться на болі на медіальній поверхні гомілки при згинанні стопи. Лікар повинен пам'ятати, що позаду malleolus medialis розташовані сухожилки слідуєчих м'язів:

*** A) m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum longus, m. tibialis posterior**

B) m. plantaris, m. tibialis posterior

C) m. triceps surae, m. tibialis posterior, m. flexor hallucis longus

D) m. triceps surae, m. flexor hallucis longus

E) m. flexor digitorum longus, m. fibularis longus

204. Хворий хлопчик 10 років доставлен у травмпункт лікарні з переломом кісток передпліччя. Дитина не може здійснити супінацію та пронацію передпліччя. У яких сугавах можливі ці рухи?

*** А) art. radioulnaris proximalis, art. radioulnaris distalis**

В) art. cubiti

С) art. radiocarpea

Д) art. humeroulnaris

Е) art. humeroradialis

205. Пострадавшему с колотой раной передней стенки желудка оказывается хирургическая помощь. В какое образование полости брюшины попало содержимое желудка?

*** А) Преджелудочную сумку**

В) Сальниковую сумку

С) Печёночную сумку

Д) Левый мезентериальный синус

Е) Правый мезентериальный синус

206. Выслушивая тоны сердца, врач обнаружил у пациента функциональные нарушения двустворчатого [митрального] клапана. В каком месте его выслушивал врач?

*** А) На верхушке сердца**

В) У мечевидного отростка

С) У места прикрепления реберного хряща справа

Д) Во втором межреберье слева у грудины

Е) Во втором межреберье справа у грудины

207. У пострадавшего ножевое ранение в поясничную область справа. Имеет место повреждение правой почки. Какие органы забрюшинного пространства могут быть повреждены при этом(

*** А) 12-перстная кишка**

- В) Поперечно-ободочная кишка
- С) Левый изгиб поперечно-ободочной кишки
- Д) Нисходящий отдел ободочной кишки
- Е) Начальный отдел тощей кишки

208. Больной умер от острой почечной недостаточности [вследствие отека почечной паренхимы]. Какая оболочка почки будет с трудом отделяться от почечного вещества при патологоанатомическом вскрытии?

*** А) Фиброзная капсула**

- В) Почечная фасция
- С) Жировая капсула
- Д) Забрюшинная фасция
- Е) Предбрюшинная фасция

209. Во время операции из почечной лоханки удален камень размерами 3х4 см, имеющий с одной стороны три выроста в виде рогов [коралловидный камень]. Каким анатомическим образованиям соответствуют эти выросты?

*** А) Большим чашечкам**

- В) Нефронам
- С) Малым чашечкам
- Д) Лоханке почки
- Е) Долькам почки

210. На экскреторной урограмме [контрастировании мочевыводящих путей] определяется широкая мешковидная лоханка, в которую непосредственно впадаю малые чашечки, большие отсутствуют. Укажите форму экскреторных путей почки.

*** А) Эмбриональная**

- В) Фетальная
- С) Зрелая
- Д) Филогенетическая
- Е) Онтогенетическая

211. У новорожденного мальчика при осмотре мошонки в правой половине не обнаружено яичка. О какой аномалии развития идет речь(

*** А) Монорхизме**

- В) Гермафродитизме
- С) Крипторхизме
- Д) Гипоспадии
- Е) Эписпадии

212. У больного водянка яичка. В пределах какой оболочки яичка локализован процесс(

*** А) Влагалищной оболочки**

- В) Мясистой оболочки
- С) Наружной семенной фасции
- Д) Внутренней семенной фасции
- Е) Кожи мошонки

213. Ультразвуковое исследование органов малого таза осуществляется при наполненном мочевом пузыре. Какая мышца промежности удерживает при этом мочу?

*** А) Сфинктер мочеиспускательного канала**

- В) Луковично-губчатая
- С) Седалищно-пещеристая
- Д) Поверхностная поперечная
- Е) Глубокая поперечная

214. Во время родовой деятельности при трудном прорезывании головки плода во избежание разрыва промежности производят рассечение отверстия влагалища у основания большой половой губы. Какую мышцу промежности при этом рассекают?

*** А) Луковично-губчатую**

- В) Седалищно-пещеристую
- С) Поверхностную поперечную
- Д) Наружный сфинктер прямой кишки
- Е) Глубокую поперечную

215. При ревизии полости брюшины у больного по поводу перитонита обнаружен ограниченный гнойник у корня брыжейки сигмовидной кишки. В каком образовании брюшины находится гнойник?

*** А) Межсигмовидная ямка**

- В) Правый брыжеечный синус
- С) Правый боковой канал
- Д) Левый боковой канал
- Е) Левый брыжеечный синус

216. Больная жалуется на боли в правой подвздошной области. При пальпации определяется подвижная, мягкая, болезненная кишка. Какую кишку пальпирует врач?

*** А) Слепую**

В) Сигмовидную

С) Прямую

Д) Восходящую ободочную

Е) Тощую

217. Больной предъявляет жалобы на боли в верхнем отделе пупочной области. Пальпаторно определяется подвижная болезненная кишка. Какую кишку пальпирует врач?

*** А) Поперечно-ободочную**

В) Тощую

С) Двенадцатиперстную

Д) Подвздошную

Е) Сигмовидную.

218. У пострадавшего колото- резаная рана нижнего отдела задней стенки подмышечной ямки. Какие мышцы повреждены при этом?

*** А) Широчайшая мышца спины**

В) Трехглавая мышца плеча

С) Большая грудная мышца

Д) Дельтовидная мышца

Е) Подостная мышца

219. В результате удара колесом мотоцикла сзади в область средней трети голени у пострадавшего разрыв глубоких кровеносных сосудов, образовалась обширная гематома, ушиб нервов. В каком анатомическом образовании лежит поврежденный сосудисто-нервный пучок голени?

*** А) Голено-подколенном канале**

В) Бедренно-подколенном канале

С) Запирательном канале

Д) Верхнем мышечно-малоберцовом канале

Е) Нижнем мышечно-малоберцовом канале

220. Больной начал отмечать повышение температуры тела до 38(С, позывы к дефекации, а затем боли в области ануса. При осмотре проктологом диагностирован ишиоректальный парапроктит [воспаление параректальной клетчатки, делится мышцей промежности на ишиоректальную и параректальную ямки]. Назовите эту мышцу(

*** А) Мышца, поднимающая задний проход**

В) Наружная поперечная

С) Внутренняя поперечная

Д) Луковично-губчатая

Е) Внутренний сфинктер заднего прохода

221. Мужчина 75-лет. поступил в урологическое отделение с жалобами на выраженные боли внизу живота, отсутствие мочи, невозможность самостоятельного мочеиспускания. При осмотре урологом установлен диагноз: аденома [доброкачественная опухоль] предстательной железы. Показана катетеризация мочевого пузыря. Какова последовательность прохождения катетера через отделы мочеиспускательного канала(

*** А) Губчатая, перепончатая, предстательная**

В) Губчатая, предстательная, перепончатая

С) Перепончатая, губчатая, предстательная

Д) Предстательная, перепончатая, губчатая

Е) Перепончатая, предстательная, губчатая

222. В положении на спине шестимесячный ребенок задыхается. Пальпаторно на передней стенке трахеи до яремной вырезки грудины определяется опухолевидное образование, уходящее в переднее средостение. Какой орган может сдавливать трахею?

*** А) Вилочковая железа**

В) Щитовидная железа.

С) Околощитовидные железы

Д) Околощитовидные лимфатические узлы

Е) Околотрахеальные лимфатические узлы

223. У пацієнта встановлена патологічна рухливість у плечовому суглобі. На яку відстань можуть віддалятися в нормі суглобові поверхні лопатки та плечової кістки під час рухів у плечовому суглобі?

*** А) до 3 см**

В) до 4 см

С) до 5 см

Д) до 2 см

Е) до 1 см

224. У хворого спостерігається перфорація запаленого хробакоподібного відростка. Ревізію якого з карманів очеревини хірург повинен провести в першу чергу?

- * A) recessus retrocaecalis**
- B) recessus duodenalis superior
- C) recessus duodenalis inferior
- D) recessus ileocaecalis superior
- E) recessus ileocaecalis inferior

225. У пацієнта - травматичне ушкодження (розрив) жовчного міхура. До якого з утворів очеревини може в першу чергу потрапити жовч?

- * A) bursa omentalis**
- B) bursa pregastrica
- C) sulcus paracolicus sinister
- D) sinus mesentericus dexter
- E) sinus mesentericus sinister

226. У хворого виявлено порушення кровотоку у басейні правої передньої мозкової артерії. Які ділянки кори кінцевого мозку можуть постраждати за цих умов?

- * A) медіальна поверхня правих лобної та тім'яної часток**
- B) медіальна поверхня правої потиличної частки
- C) нижня поверхня правої лобної частки
- D) нижня поверхня правої скроневої частки
- E) права острівцева частка

227. У хворого виявлено порушення кровотоку у басейні лівої задньої мозкової артерії. Які ділянки кори кінцевого мозку можуть постраждати за цих умов?

*** A) нижня поверхня лівих скроневої та потиличної часток**

B) присередня поверхня лівих скроневої та потиличної часток

C) присередня поверхня лівих потиличної та тім'яної часток

D) нижня поверхня лівих лобної та скроневої часток

E) бічна поверхня лівих скроневої та потиличної часток

228. У хворого встановлена наявність каменю у місці переходу правої ниркової миски до сечоводу. Позаду якої структури знаходиться початковий відділ правого сечоводу?

*** A) pars descendens duodeni**

B) flexura coli dextra

C) colon ascendens

D) pars superior duodeni

E) pars horizontalis duodeni

229. У хворого на гайморит порушено сполучення верхньощелепової біляносової пазухи з середнім носовим ходом. Який утвір в нормі забезпечує надходження повітря з носового ходу до гайморової пазухи?

*** A) hiatus semilunaris**

B) infundibulum ethmoidale

C) foramina ethmoidalia

D) recessus sphenopalatinus

E) canalis nasolacrimalis

230. У хворого спостерігається зниження гостроти слуху. Який з вказаних анатомічних структур не бере участь у проведенні механічних коливань до Кортієва органа?

*** A) tuba auditiva**

- B) scala vestibuli
- C) membrana tympani
- D) scala tympani
- E) ossicula auditus

231. У хворого встановлено ураження внутрішнього вуха судинного генезу. Гілками якої з названих артерій, головним чином, здійснюється кровопостачання внутрішнього вуха?

*** A) a. basilaris**

- B) a. cerebri posterior
- C) a. vertebralis
- D) a. cerebri media
- E) a. cerebri anterior

232. У хворого діагностовано злоякісну пухлину черевної частини стравоходу. Яка група лімфатичних вузлів є регіонарною для вказаного відділу стравоходу?

*** A) anulus lymphaticus cardiae**

- B) nodi lymphatici paratrachealis
- C) nodi lymphatici prevertebralis
- D) nodi lymphatici pericardiales laterales
- E) nodi lymphatici mediastinales posteriores

233. У пацієнта під час коронарографії встановлена наявність лівовінцевого типу кровопостачання серця. Який з типів кровопостачання серця вважається переважним?

- * A) середньоправий**
- B) середньолівий
- C) лівовінцевий
- D) правовінцевий
- E) середній (рівномірний)

234. У хворого - запалення бульбоуретральних залоз. Між якими фасціями промежини знаходяться ці органи?

- * A) fasciae diaphragmatis urogenitalis superior et inferior**
- B) fasciae perinei superficialis et diaphragmatis urogenitalis inferior
- C) fasciae diaphragmatis urogenitalis superior et diaphragmatis pelvis inferior
- D) fasciae diaphragmatis pelvis inferior et superior
- E) fasciae perinei superficialis et diaphragmatis pelvis inferior

235. У хворого з аневризмою підключичної артерії спостерігається осиплість голосу. З подразненням якого нерву це може бути пов'язано?

- * A) n.laringeus reccurens dexter**
- B) n.laringeus superior dexter
- C) n.laringeus reccurens sinister
- D) n.laringeus superior sinister
- E) n.laringeus inferior sinister

236. На оглядовій рентгенограмі органів грудної порожнини пацієнта встановлено збільшення верхньої дуги лівого контуру серця. Тінь якого з органів обумовлює верхню дугу лівого контура серця?

*** A) дуги та початку нисхідної частини аорти**

- B) висхідної частина аорти
- C) легеневого стовбура
- D) лівого вушка
- E) верхньої порожнистої вени

237. Під час проведення комп'ютерної томографії головного мозку у хворого виявлено крововилив у ділянці коліна внутрішньої капсули. Який з вказаних провідникових шляхів постраждає в першу чергу?

*** A) tractus corticonuclearis**

- B) radiationes thalamicae anteriores
- C) tractus corticospinalis
- D) radiatio acustica
- E) radiatio optica

238. У хворого спостерігається стеноз лівої вінцевої артерії. Кровопостачання та функція якого з сосочкових м'язів серця може постраждати в першу чергу?

*** A) m. papillaris anterior sinister**

- B) m. papillaris posterior sinister
- C) m. papillaris anterior dexter
- D) m. papillaris posterior dexter
- E) жодного з цих м'язів

239. Хворому з порушенням функції зовнішнього дихання необхідно зробити трахеостомію. На рівні яких хрящових кілець трахеї частіше за все може знаходитися перешийок щитоподібної залози?

*** A) II-III**

B) III-IV

C) I-II

D) IV-V

E) V-VI

240. При обстеженні юнака призовного віку, лікарем було виявлено горизонтальний ністагм. Який із асоціативних провідних шляхів головного мозку з'єднує вестибулярний апарат з руховими ядрами черепних нервів ?

*** A) Fasciculus longitudinalis medialis**

B) Lemniscus medialis

C) Lemniscus lateralis

D) Tractus bulbothalamicus

E) Tractus spinocerebellaris anterior

241. У хворого спостерігаються ознаки втрати зорового сторожового рефлексу. Які ядра стовбурової частини мозку пошкоджені?

*** A) Ядра верхніх горбиків пластинки покришки**

B) Ядра нижніх горбиків пластинки покришки

C) Ядра окорухового нерва

D) Ядра блокового нерва

E) Ядра відвідного нерва

242. Після травми хворий не може утримувати тіло у вертикальному положенні, не може піднятись навшпиньки. Функція якого м'яза порушена ?

- * A) M. triceps surae**
- B) M. tibialis anterior
- C) M. extensor digitorum longus
- D) M. fibularis longus
- E) M. extensor hallucis longus

243. На державному іспиті з анатомії людини студент не зміг відповісти на запитання: “Якому органу належить rete mirabile arteriosum?” А як ви вважаєте?

- * A) Нирці**
- B) Печінці
- C) Селезінці
- D) Вилочковій залозі
- E) Наднирниковій залозі

244. При аускультатії серця пацієнта, лікар кардіолог вислуховує тони клапанів аорти в:

- * A) У другому міжребер'ї праворуч від грудини**
- B) У другому міжребер'ї ліворуч від грудини
- C) На верхівці серця
- D) На рівні хряща V правого ребра
- E) У третьому міжребер'ї ліворуч від грудини

245. При аускультатії серця пацієнта, лікар кардіолог вислуховує тони клапанів легеневого стовбура в:

*** А) У другому міжребер'ї ліворуч від грудини**

В) У другому міжребер'ї праворуч від грудини

С) На верхівці серця

Д) На рівні хряща V правого ребра

Е) У третьому міжребер'ї ліворуч від грудини

246. Оперуючи хворого, з приводу obturaції каменем сечоводу, в нижніх відділах його черевної частини, хірург повинен бути дуже обережним, щоби випадково не перев'язати :

*** А) testicularis**

В) lienalis

С) mesenterica sup.

Д) lumbalis

Е) epigastrica inf.

247. Що утворює передній серцево-судинний контур тіні серця при його рентгенологічному дослідженні в правому сосковому положенні?

*** А) Висхідна частина аорти, легеневий стовбур, лівий шлуночок.**

В) Висхідна частина аорти, лівий шлуночок.

С) Легеневий стовбур, лівий шлуночок.

Д) Легеневий стовбур, ліве передсердя.

Е) Висхідна частина аорти, ліве передсердя, лівий шлуночок.

248. Оглядаючи черевну порожнину потерпілого з проникаючим пораненням передньої черевної стінки, хірург помітив пошкодження малого сальника, з якого витікала ясно червона (артеріальна) кров. Яка артерія виявилась пошкодженою?

- * A) hepatica propria**
- B) gastroepiploica dextra
- C) hepatica communis
- D) lienalis
- E) gastroepiploica sinistra

249. До лікаря невропатолога звернувся хворий із скаргами на неможливість впізнавати предмети на дотик. Де локалізується ядро аналізатора стереогнозу?

- * A) В корі верхньої тім'яної дольки**
- B) В корі верхньої скроневої закрутки
- C) В корі середньої лобної закрутки
- D) В корі потиличної долі
- E) В корі нижньої тім'яної дольки

250. Обстежуючи секційний матеріал, патанатом помітив на внутрішній поверхні одного з відрізків кишечника folliculi lymphatici aggregati (Пееєрові бляшки). Якій кишці належить цей відрізок?

- * A) Ileum**
- B) Jejunum
- C) Duodenum
- D) Caecum
- E) Colon descendens

251. Підчас оперативного втручання виявлено пухлину жовчевого міхура з проростанням в лівий дорзальний сектор печінки. Який сегмент печінки уражений?

*** A) 1**

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

252. У хворого спостерігається порушення конвергенції. При ушкодженні яких м'язів очного яблука спостерігається дана патологія ?

*** A) Mm. recti medialis**

B) Mm. recti lateralis

C) Mm. recti superior

D) Mm. recti inferior

E) Mm. obliqui superior

253. У хворого спостерігається порушення дивергенції. При ушкодженні яких м'язів очного яблука спостерігається дана патологія ?

*** A) Mm. recti lateralis**

B) Mm. recti medialis

C) Mm. recti superior

D) Mm. recti inferior

E) Mm. obliqui superior

254. Жінку госпіталізовано в клініку з симптомами гострого живота. При обстеженні виникла підозра на позаматкову вагітність. Яке з анатомічних утворень таза необхідно пропунктувати для підтвердження вірного діагнозу?

- * А) Excavatio rectouterina**
- В) Excavatio vesicouterina
- С) Excavatio rectovesicalis
- Д) Fossa ischiorectalis
- Е) Processus vaginalis peritonei

255. Хворий 65 років звернувся в клініку з приводу розладів сечопуску. При обстеженні виявлено гіпертрофію простати. Збільшення яких з перелічених частин передміхурової залози є можливою причиною даних порушень?

- * А) Перешийок (середня частка)**
- В) Права частка
- С) Ліва частка
- Д) Капсула простати
- Е) Проточка передміхурової залози

256. У хворі діагностовано гіпертонічну хворобу ниркового походження. Пошкодження якої з перелічених структур нирки може бути ймовірною причиною даного захворювання?

- * А) Юктагломерулярний апарат**
- В) Юкстамедулярний апарат
- С) Форнікальний апарат
- Д) Петля Генле
- Е) Капсула клубочка

257. Параніхій мізинця ускладнився флегмоною кисті та передпліччя. Нагнійний процес поширився по:

*** А) Vagina synovialis communis mm.flexorum**

- В) Vagina tendinis m.flexor pollicis longi
- С) Canalis carpalis
- Д) Vagina tendinis m.flexor carpi radialis
- Е) Міжфасціальних просторах

258. Яка анатомічна особливість новонародженого сприяє утворенню гематом голови при пологових травмах?

*** А) Рихле з'єднання сухожильного шолому з окістям кісток склепіння черепа**

- В) Недостатня міцність судинної стінки.
- С) Слабкий розвиток підшкірно-жирового шару шкіри голови.
- Д) Наявність тім'ячок.
- Е) Підвищена рухомість кісток, що формують склепіння черепа.

259. У хворого гнійній паротит ускладнився заглотковим абсцесом. За рахунок особливостей будови якого фасціального листка шиї це стало можливим?

*** А) Глибокого листка привушної фасції.**

- В) Скреневої фасції.
- С) Поверхневого листка власної фасції шиї.
- Д) Глибокого листка власної фасції шиї.
- Е) Поверхневого листка привушної фасції.

260. При виконанні ретроградної аортографії пунктують стегнову артерію, просуваючи катетер у краніальному напрямку. В якій судині опиниться катетер після проходження стегнової артерії?

*** А) Зовнішній клубовій артерії.**

В) Внутрішній клубовій артерії.

С) Підколінній артерії.

Д) Верхній брижовій артерії.

Е) Нижній брижовій артерії.

261. Хворий скаржиться на серцебиття, часті носові кровотечі та головні болі в потиличній ділянці, швидку втомлюваність при фізичному навантаженні. Ліва границя серця зміщена вліво на 1 см від лівої грудинно-ключичної лінії.

*** А) Гіпертрофія стінки лівого шлуночка зумовлена гіпертензією у великому колі кровообігу.**

В) Носова кровотеча, як результат травми носа.

С) Стеноз судин у вертебро-базилярній системі.

Д) Стеноз лівого передсердно-шлуночкового отвору.

Е) Вроджена вада серця: недостатність митрального клапану.

262. З чого розвивається нижня порожниста вена?

*** А) Нижніх серцевих вен.**

В) Загальних клубових вен.

С) Верхньої брижової вени.

Д) Ворітної вени.

Е) Нижньої брижової вени.

263. Під час операції закриття природженої щілини піднебіння (уранопластики), при збиванні долотом крилоподібного гачка, ушкоджено великий піднебінний канал. Виникла кровотеча яку можна зупинити лише шляхом тампонади каналу. Яку артерію ушкоджено?

- * А) Низхідну піднебінну артерію.**
- В) Висхідну піднебінну артерію.
- С) Висхідну глоткову артерію.
- Д) Клиноподібну артерію.
- Е) Задню верхню альвеолярну артерію.

264. Хворий звернувся до поліклініки у зв'язку з запальним процесом поверхневих тканин великого пальця руки. При огляді виявлено лімфангіїт в ділянці передпліччя. Лімфатичні пахвові вузли збільшені і болючі. Вздовж якої вени поширилась інфекція?

- * А) Головної.**
- В) Ліктьової.
- С) Променевої.
- Д) Основної.
- Е) Серединної.

265. При лапаротомії хірургом виявлено гангренозне ураження низхідної ободової кишки. Тромбоз якої артерії зумовив цей стан?

- * А) Лівої ободової.**
- В) Серединної ободової.
- С) Правої ободової.
- Д) Клубово-ободової.
- Е) Верхньої брижової.

266. У пацієнта вислуховується шум на кінці тіла грудини. Про ваду якого клапана серця це свідчить?

*** А) Тристулкового.**

В) Мітрального.

С) Клапана аорти.

Д) Клапана венозного стовбура.

Е) Клапана нижньої порожнистої вени.

267. Яка артерія служить для вимірювання пульсу в ділянці гомілково-стопного суглобу?

*** А) Тильна артерія стопи.**

В) Дугоподібна артерія.

С) Передня великогомілкова артерія.

Д) Задня великогомілкова артерія.

Е) Малогомілкова артерія.

268. Яка артерія виходить з привідного каналу разом з підшкірним нервом?

*** А) Низхідна колінна артерія.**

В) Стегнова артерія.

С) Задня великогомілкова артерія.

Д) Передня великогомілкова артерія.

Е) Проксимальна частина стегнової артерії.

269. У пораненого в ділянку лівої надключичної ямки витікає у великій кількості жовтувата рідина. Яка судина пошкоджена?

*** А) Грудна протока.**

В) Венозний кут.

С) Лімфатична протока.

Д) Плевральна порожнина.

Е) Ліва лімфатична протока.

270. Через які вени у хворого може розповсюдитись гнійний процес зі шкіри волосистої частини голови на мозкові оболонки?

*** А) Випускні і диплоетичні вени.**

- В) Випускні вени.
- С) Диплоетичні вени.
- Д) Поверхневі скроневі вени.
- Е) Поверхневі мозкові вени.

271. Що утворює правий бічний серцево-судинний контур тіні серця при його рентгенологічному дослідженні (хід променів дорсовентральний)?

*** А) Праве передсердя, висхідна частина аорти, верхня порожниста вена.**

- В) Праве передсердя, правий шлуночок.
- С) Праве передсердя, верхня порожниста вена.
- Д) Праве передсердя, праве вушко, дуга аорти.
- Е) Правий шлуночок, висхідна частина аорти, верхня порожниста вена.

272. Що утворює лівий бічний серцево-судинний контур тіні серця при його рентгенологічному дослідженні (хід променів дорсовентральний)?

*** А) Лівий шлуночок, ліве вушко, дуга і низхідна частина аорти, легеневий стовбур.**

- В) Ліве передсердя, ліве вушко, верхня порожниста вена.
- С) Лівий шлуночок, ліве вушко, низхідна частина аорти.
- Д) Лівий шлуночок, ліве передсердя, ліве вушко, дуга аорти.
- Е) Лівий шлуночок, ліве вушко, ліве передсердя.

273. Що утворює передній серцево-судинний контур тіні серця при його рентгенологічному дослідженні в лівому сосковому положенні?

- * А) Праве передсердя, правий шлуночок.**
- В) Легеневий стовбур, лівий шлуночок.
- С) Легеневий стовбур, ліве передсердя.
- Д) Праве передсердя, верхня порожниста вена.
- Е) Правий шлуночок, верхня порожниста вена.

274. Що утворює задній серцево-судинний контур тіні серця при його рентгенологічному дослідженні в правому сосковому положенні?

- * А) Висхідна частина аорти, ліве передсердя, праве передсердя, нижня порожниста вена.**
- В) Ліве передсердя, праве передсердя, нижня порожниста вена.
- С) Висхідна частина аорти, ліве передсердя.
- Д) Праве передсердя, нижня порожниста вена.
- Е) Правий шлуночок, праве передсердя, нижня порожниста вена.

275. У хворого спостерігається ішемія тканин нижче колінного суглоба, що супроводжується «переміжною кульгавістю». Про оклюзію якої артерії можна думати?

- * А) Підколінна артерія.**
- В) Малогомілкова артерія.
- С) Задня великогомілкова артерія.
- Д) Передня великогомілкова артерія.
- Е) Проксимальна частина стегнової артерії.

276. В приймальній покій поступив хворий з переломом кісток кисті з сильною кровотечею в ділянці анатомічної табакерки. Яка судина пошкоджена?

*** А) Променева артерія.**

- В) Ліктьова артерія.
- С) Передня міжкостиста артерія.
- Д) Задня міжкостиста артерія.
- Е) Поверхнева долонна дуга.

277. Чоловік 35 років звернувся до хірурга зі скаргами на болі при ходьбі, оніміння і “повзання мурашок” в ділянці п'яткової області та бічної поверхні нижньої третини гомілки. Яка судина уражена?

*** А) Малогомілкова артерія.**

- В) Задня великогомілкова артерія.
- С) Передня великогомілкова артерія.
- Д) Присередня підшовна артерія.
- Е) Бічна підшовна артерія.

278. Назвіть артерію, яка має основне значення у розвитку коллатерального кровообігу нижньої кінцівки після перев'язки зовнішньої клубової артерії

*** А) Внутрішня клубова**

- В) Присередня огинаюча стегно
- С) Бічна огинаюча стегно
- Д) Поверхнева надчревна
- Е) Поверхнева огинаюча стегно

279. У хворого 30 років внаслідок пухлини гіпофіза спостерігається порушення зору – випали медіальні поля зору, що є наслідком враження:

*** A) Chiasma opticum**

- B) n. opticus
- C) Tractus opticus
- D) Corpus geniculatum mediale
- E) Corpus geniculatum laterale

280. Хірург, здійснюючи доступ до органів грудної порожнини, зробив розріз на передній грудній стінці по одному з міжребрових просторів. При цьому він особливо обережно розтинав скальпелем тканини в передній медіальній ділянці міжребрового простору, щоб не пошкодити артерію, яка розташована паралельно краю груднини на 1-1,5 см латерально від неї. Яку артерію остерігався пошкодити хірург?

*** A) Внутрішню грудну артерію.**

- B) Міжреброву передню артерію.
- C) Верхню діафрагмальну артерію
- D) Реброво-шийний стовбур
- E) Нижню діафрагмальну артерію

281. При обстеженні чоловіка 50 років лікар вислухав патологічні серцеві шуми в місці проекції верхівки серця на передню грудну стінку. Де частіше за все проектується верхівка серця по відношенню до лівої середньоключичної лінії?

*** A) На 1 см присередньо від неї в 5 міжребровому просторі.**

- B) На 3 см присередньо від неї в 6 міжребровому просторі.
- C) На 2 см латерально від неї в 5 міжребровому просторі.
- D) На 1 см присередньо від неї в 6 міжребровому просторі.
- E) На 3 см латерально від неї в 5 міжребровому просторі

282. Обстежуючи хворого, хірург досліджує пульсацію артерії позаду медіальної кісточки. Пульсацію якої артерії досліджує хірург?

- * A) Задньої великогомілкової артерії**
- B) Малогомілкової артерії
- C) Передньої великогомілкової артерії
- D) Задньої поворотної великогомілкової артерії
- E) Передньої поворотної великогомілкової артерії

283. У жінки 40 років фіброміома матки. Виконана надпівхвова ампутація матки з видаленням маткових труб. Яєчники здорові, не видалені. Повністю збережена lig. suspensorium ovarii, в якій проходить судина, яка кровопостачає яєчники . Назвіть цю судину.

- * A) a. ovarica**
- B) Ramus ovaricus a.uterina
- C) a. pudenda interna
- D) a. iliaca interna
- E) a. iliaca externa

284. Хворий, 45 років, скаржиться на запаморочення, шаткість під час ходьби, порушення координації рухів. При обстеженні встановлено, що у хворого остеохондроз шийного відділу хребтового стовбура і стиснута судина, яка проходить через поперечні отвори шийних хребців. Яка це судина?

- * A) a. verterbralis**
- B) a. subclavia
- C) a. carotis externa
- D) a. carotis interna
- E) a. occipitalis

285. У потерпілого виявлено перелом тіла та верхньої гілки лобкової кістки, уламки пошкодили судини, що проходять в судинній лакуні. Які судини пошкоджені?

*** A) a. et v. femoralis**

B) a. et v. iliaca interna

C) a. et v. iliaca externa

D) a. et v. pudenda interna

E) a. et v. Epigastrica superficialis

286. При видаленні жовчного міхура в лігатуру замість однієї а. cystysa була втягнена артерія, перев'язка якої призвела до некрозу правої частки печінки і смерті. Яка артерія була помилково перев'язана разом з а. cystysa?

*** A) Ramus dexter a. hepatica propria**

B) a. hepatica communis

C) a. gasro-duodenalis

D) a. hepatica propria

E) a. pancreato- duodenalis sup.

287. При позаматковій вагітності у жінки відбувся розрив маткової труби, що призвело до кровотечі. Пошкодження якої судини викликало кровотечу?

*** A) Ramus tubaria a. uterina**

B) Ramus ovaricus a. uterina

C) a. ovarica

D) a. pudenda interna

E) a. iliaca interna

288. При гнійному запаленні середнього вуха в патологічний процес втягнена артерія, яка розташована на передній стінці барабанної порожнини. Яка судина втягнена в патологічний процес?

*** A) a. carotis interna**

B) a. carotis externa

C) a. meningea media

D) a. auricularis posterior

E) a. temporalis superficis

289. При проведенні хірургічного втручання в ділянці трепанаційного трикутника з приводу гнійного мастоїдиту пошкоджено судину, що призвело до утворення гематоми позаду вушної раковини. Яка судина пошкоджена?

*** A) a. auricularis posterior**

B) a. occipitalis

C) Ramus mastoideus a. occipitalis

D) a. temporalis superficis

E) a. facialis

290. При видаленні злоякісної пухлини верхньої третини прямої кишки перев'язана a. rectalis superior. Від якого артеріального стовбура бере початок ця судина?

*** A) a. mesenterica inf**

B) a. mesenterica superior.

C) a. iliaca interna

D) a. iliaca externa

E) a. pudenda interna

291. При видаленні пухлини підшлункової залози пошкоджена судина, яка проходить по верхньому краю підшлункової залози. Яка судина пошкоджена?

*** A) a. lienalis**

B) a. pancreato- duodenalis superior.

C) a. pancreato- duodenalis inferior.

D) a. gastro- epiploica dextra.

E) a. gastro- epiploica sinistra.

292. Хлопчику 12 років за медичними показниками зробили видалення загруднинної залози. При цьому перев'язали судини, які кровопостачають цю залозу. Основним джерелом цих судин є:

*** A) a. thoracica interna**

B) Tr. Thyrocervicalis

C) a. vertebralis

D) Tr. Costocervicalis

E) Aorta . thoracica

293. При видаленні злоякісної пухлини нижньої третини прямої кишки перев'язана a. rectalis inferior. Від якого артеріального стовбуру відходить ця гілка?

*** A) a. pudenda interna**

B) a. iliaca interna

C) a. iliaca externa

D) a. mesenterica inferior

E) a. femoralis

294. У чоловіка 35 років під час травми задньої поверхні плеча був пошкоджений променевий нерв і артеріальна судина, яка проходить поруч з ним в canalis humeromuscularis .Яка артерія була пошкоджена?

*** A) a. profunda brachii**

B) a. axillaris

C) a. radialis

D) a. ulnaris

E) a. brachialis

295. У 5-річного хлопчика під час обстеження було виявлено незарощення артеріальної протоки. Ця протока, ductus arteriosus, з'єднує у плодів людини?

*** A) Truncus pulmonalis з початком aorta descendens**

B) Truncus pulmonalis arcus з aorta ascendens

C) Truncus pulmonalis arcus з початковим відділом Arteria subclavia

D) Truncus pulmonalis arcus et bulbus aortae

E) Truncus pulmonalis arcus et truncus brachiocephalicus